

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้น

อาจสูงได้ถึง 30 ม. หูใบอยู่ในซอกก้านใบ ยาวประมาณ 6 มม. ติดทน ใบเรียงเวียน รูปรีหรือรูปไข่กลับ ยาว 4-10 ซม. ปลายมนหรือเว้าตื้น ก้านใบ ยาว 3-7 มม. ดอกออกเป็นกระจุกตามซอกใบ ใบประดับ 2 ใบ ขนาดเล็ก ก้านดอกยาว 0.3-1 ซม. ขยายในผล หลอดกลีบเลี้ยงสั้น กลีบรูปสามเหลี่ยม ขนาดเล็ก มี 5 กลีบ ติดทน กลีบดอกเรียงซ้อนเหลื่อม ในตาดอก มี 5 กลีบ รูปขอบขนาน ยาว 3-4 มม. โคนมีลิ่มสั้น ๆ เกสรเพศผู้ 10 อัน เชื่อมติดกันเป็นหลอด ยาวไม่เท่ากัน 2 ชุด ยาวกว่ากลีบเลี้ยงเล็กน้อย ติดทน รังไข่มี 3 ช่อง แต่ละช่องมีออวุล 1-2 เม็ด ส่วนมากพัฒนาช่องเดียว ก้านเกสรเพศเมีย 3 อัน ติดทน ผลผนังชั้นในแข็ง รูปขอบขนาน ยาว 0.8-1 ซม. สุกสีแดง เมล็ดแบน เรียว ยาว 6-8 มม. ผิวเป็นร่อง พบที่พม่า คาบสมุทรมลายู บอร์เนียว สุมาตรา ชวา และฟิลิปปินส์ ในไทยพบทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ และภาคใต้ ขึ้นตามป่าดิบชื้นใกล้ชายฝั่งทะเล

ข้อมูลอ้างอิง : [http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordsname=Erythroxylum0cuneatum0\(Miq.\)0Kurz](http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordsname=Erythroxylum0cuneatum0(Miq.)0Kurz)ภาพประกอบ : ภาพดอก/ภาพผล : [http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordsname=Erythroxylum0cuneatum0\(Miq.\)0Kurz](http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordsname=Erythroxylum0cuneatum0(Miq.)0Kurz)

ภาพใบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี