

ชื่ออื่น : กะหารี กุปิงยะซี

ไม้ต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 5-25 เมตร ขึ้นตามชายน้ำ ใน ประกอบแบบชนนก ในย่อยรูปเบี้ยแคนขอบใบจักฟันเลือย ในอ่อนสีแดง สีชมพูกออกส้ม ถึงสีเขียว ดอก เพศผู้และเพศเมียอยู่บนต้นเดียวกัน ดอกสีขาว มีขนบริเวณขอบและผิวต้านล่าง มีขนบริเวณก้านช่อดอก ดอกออกเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม ผลสีน้ำตาลถึงดำ เมล็ดกว้างประมาณ 2 เซนติเมตร ออกผลสิงหาคมถึงพฤษจิกายน พบรตามป่าดิบชื้น ความสูง เหนือระดับน้ำทะเล 600 เมตร ออกดอก เดือนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม ออกผล เดือนสิงหาคม พฤศจิกายน -มกราคม กระจายพันธุ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งภาคใต้ของประเทศไทยบางจังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรังและพัทลุง คนท้องคินนำเมล็ดมาสักดันน้ำมัน ใช้สำเพ็ມเพื่อบำรุงผอม และรักษาโรคผิวหนังบางชนิด



ข้อมูลอ้างอิง : http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com_dofplant&view=showone&id=2409

ภาพประกอบ : <https://www.flickr.com/photos/adaduitokla/7784948144/in/photostream/>



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

