

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้น

ไม้ผลัดใบ สูงถึง 28 ม. บางทีมีพุ่มพองเล็ก เปลือกสีครีมถึงเทาอ่อน เรียบหรือแตกเล็กน้อยเป็น แผ่น เปลือกในสีส้มถึงแดงอ่อน มีน้ำยางแทรกอยู่ ใบ ยาว 25-45 ซม. ใบย่อย 2-6 คู่ รูปไข่ถึงรีหรือรูปใบ หอก กว้าง 2.5-9(12) ซม. ยาว 6-18(24) ซม. ปลายเรียวแหลม โคนห่อหรือกลมเบี้ยว ขอบจักห่างไปทาง ปลายใบ ใบแก่คล้ายแผ่นหนัง ด้านบนเป็น มันเกลี้ยงหรือมีขนบนเส้นกลางใบด้านล่าง ใบแห้งสีน้ำตาลแดง เส้นใบ 10-16 (20) คู่ มักจะโค้งใกล้ขอบใบ ฐานด้านล่าง เส้นร่างแหจากทั้งสองด้าน ก้านใบย่อยยาว 0.5-1.2 ซม. (ก้านใบปลายสุดยาวประมาณ 2.5 ซม.) หูใบยาว 1-2.5 ซม. จักเป็นแฉกไม่เท่ากัน ติดทนที่ก้านใบ ใกล้โคน เนื้อแห้งสีอมเทา ดอกสีขาวหรือเหลืองอ่อน เป็นช่อแคบ ยาว 13-26 ซม. ออกตามง่ามใบบนหรือมี หลายช่อใกล้ปลายกิ่ง มีขนละเอียดสีเทาหรือสีสนิมแน่น ก้านดอกยาว 2-4 ซม. แข็ง สีเขียวอ่อนถึงม่วงอม แดง กลีบเลี้ยงยาวประมาณ 3 มม. มีขนละเอียดแน่น(แต่น้อยกว่าในกลีบดอก) ดอกเพศผู้ ขนาด 5-6 มม. เป็นช่อแตกแขนงแน่น กลีบดอกรูปไข่กว้าง ค่อนข้างกางออก เกสรเพศผู้ 6 อัน เกลี้ยง เชื่อมติดกับจานฐาน ดอกนุ้มจัก 12 พู ล้อมรอบเกสรเพศเมียเป็นหมันยาวมากกว่า 0.5 มม. ดอกเพศเมียขนาด 6-8 พู เป็นช่อสั้น และดอกน้อยกว่า กลีบดอกมีปลายหนา โค้งขึ้นไม่กางออก เกสรเพศผู้ติดกับจานฐานดอกเกสรเพศเมียไม่มี ขน ผลกว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 2-3 ซม. ออกเป็นช่อยาวถึง 20 ซม. มีขน มี 2-10 ผล รูปรีหรือไข่กลับ ค่อนข้างเป็นสามเหลี่ยมเมื่อตัดขวาง ไม่มีขน เมื่อแก่สีม่วงดำเป็นมัน กลีบเลี้ยง 1.3 ซม. รูปกรวยกว้าง ผนังผล ชั้นในมี 3 มุม เกลี้ยง ภายในมี 1(3) เมล็ด พบทั่วไปในป่าดิบสูง สูง 700 ม. มักพบตามเชิงหน้าผาเขาหินปูน



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชมอน พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม่ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2559. 792 หน้า

ภาพประกอบ : ภาพวาด : <http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Canarium0denticulatum0Blume>

ภาพกลางและซ้าย : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

