

ไม้ต้น สูง 10-20 ม. ใบ แกนกลางใบยาว 3-9 ซม. ใบย่อย 3-4 ใบ กว้าง 2.5-4.5 ซม. ยาว 6-14 ซม. ใบล่างมักมีขนาดเล็กที่สุด รูปรีถึงใบหอก หรือรูปไข่กลับแคบ ปลายเรียวแหลม โคนกลมหรือรูปลิ้น สมมาตรหรือเกือบสมมาตร ใบย่อยแก่เนื้อคล้ายหนังบาง เกลี้ยงหรือมีขนละเอียด กระจายเฉพาะบนเส้นกลางใบ เส้นใบ 6-10 คู่ ค่อนข้างจาง ก้านใบย่อยยาว 2-5 มม. เกลี้ยง ใบยาว 3 มม. อยู่ติดกับก้านใบ ดอก เป็นช่อห้อย ยาว 10-22 ซม. ตามซอกใบ หรือที่ปลายกิ่ง มีขนละเอียด ใบประดับยาว 3 มม. แยกเป็น 3 พู ใบประดับย่อยเล็กมาก ก้านดอกยาว 2-6 มม. มีข้อต่อที่โคน ขนละเอียด ใบประดับยาว 3 มม. แยกเป็น 3 พู ใบประดับย่อยเล็กมาก ก้านดอก ยาว 2-6 มม. มีข้อต่อที่โคน ขนละเอียด กลีบเลี้ยง กว้าง 3 มม. ยาว 4 มม. ขนาดไม่เท่ากัน ปลายหู่ มีขนด้านนอก เกลี้ยงด้านใน เกสรเพศผู้ 10 อัน ยาว 3-6 มม. (อาจยังไม่แก่) รังไข่ยาว 2-3 มม. ก้านสั้น ยาว 1 มม. มีขน ไม่รวมกัน ก้านเกสร เพศเมีย ยาว 3 มม. เกลี้ยง ยอดเกสรเพศเมียไม่ชัด ผล กว้าง 4 ซม. ยาว 6 ซม. รูปไข่เบี้ยว ที่ปลายมีจะงอย เบี้ยวสั้น ยาว 7 มม. มีเส้นขีดหรือเป็น แอ่งบวม ไม่สม่ำเสมอ มีขนกำมะหยี่สีสนิม เมล็ดกลมใหญ่ 1-2 เมล็ด ยาว 2.5 ซม. พบน้อยในป่าดิบที่ต่ำ จ.ระนอง สุราษฎร์ธานี ตรัง ปัตตานี นราธิวาส



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต, ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.- กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คปฟ. 2559. 792 หน้า.

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์มรดกอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

