

ไม้ต้นเล็กเรียว สูงได้ถึง 20 เมตร เปลือกสีน้ำตาลอ่อนถึงน้ำตาลเข้ม มักแตกเป็นร่องตื้น แต่ ไม่ลอกออก เปลือกในสีชมพูอมส้มถึงน้ำตาลแดง มีน้ำเลี้ยงสีแดงอมส้ม ใบ กว้าง 4-11 เซนติเมตร ยาว 12-30 เซนติเมตร ออกเป็น 2 แถว รูปรีถึงรูปไข่กลับแคบหรือใบหอกแกมขอบขนาน ปลายใบเรียวแหลมสั้น โคนแคบ เนื้อบาง แก่เกลี้ยงทั้งสองด้าน ไม่มีจุดดำด้านล่าง เส้นกลางใบนูนด้านบน เส้นใบ 12-20 คู่ เล็กเรียว โค้ง ค่อนข้างขนานกัน นูนชัดด้านบน เส้นใบย่อยจาง ก้านใบยาว 0.8-2 เซนติเมตร กิ่งค่อนข้างเป็นมุมหรือแบนที่ โกล่ปลาย มีสัน 2 สันระหว่างก้านใบ มีขนสีสนิมเข้มเมื่ออ่อน แก่เกลี้ยง กิ่งสีน้ำตาลอ่อน ดอกเพศผู้ขนาด 1.2-1.8 มิลลิเมตร สีเหลืองออกเขียวถึงเหลืองเข้ม กลิ่นหอม เป็นช่อแตกแขนง 3-4 ชั้น กว้าง 5-18 เซนติเมตร ยาว 7-22 เซนติเมตร มีหลายดอก มีชู่ประปรายถึงมากเมื่ออ่อน ก้านช่อดอกยาว 0.6-1.8 เซนติเมตร ออกเป็นกลุ่มห่างๆ มี 3-6 ดอก ก้านดอกยาว 1.5-2.5 มิลลิเมตร มีข้อต่อ กลีบเลี้ยงจัก 1/3-1/2 ของกลีบเป็น 3(4) พู ทรงกลมหรือรูปไข่กลับกว้าง อับเรณู 6-10 อัน เป็นกระจุกลมหรือรูปไข่กลับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8-1.2 มิลลิเมตร ค่อนข้างเป็นมุมเมื่อตัดขวาง ปลายบวมเล็กหรือกลวง ดอกเพศเมียขนาดประมาณ 2.5 มิลลิเมตร ออกเป็นช่อมีหลายดอก กว้าง 2-6 เซนติเมตร ยาว 3-8 เซนติเมตร ก้านดอกยาว 1-1.5 มิลลิเมตร กลีบรวมรูปรี นอกนั้นเหมือนของดอกเพศผู้ รังไข่มีสันด้านหนึ่ง เป็นร่องอีกด้านหนึ่ง เกลี้ยง ผล กว้าง 1.8-2.6 เซนติเมตร ยาว 2-3 เซนติเมตร ก้านผลยาวได้ถึง 0.5 เซนติเมตร เป็นช่อมีผล 4-12(20) ผล ทรงรีกว้าง ไม่มีกลีบเลี้ยงติดทนที่โคน สีเขียวสด แก่สีส้มอมเหลือง เกลี้ยง ผนังบาง (หนา 1.5-4 มิลลิเมตร)

พบกระจายทั้งในป่าดิบเดิมและป่าที่ถูกทำลาย สูงได้ถึง 600 เมตร ส่วนมากขึ้นใกล้น้ำ หรือในบึงชื้นและ จ.ระนอง พังงา นครศรีธรรมราช นราธิวาส



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชมอน. ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์กรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี