

เลือดควายใบเล็ก

ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดกลาง สูงได้ถึง 20 ม. เปลือก สีน้ำตาลอมเทาถึงน้ำตาลเข้ม แตกเป็นรอยตื้นๆ เปลือกใน สีชมพูมีน้ำเลี้ยงสีแดงอมส้ม ใบ กว้าง 1.5-9 ซม. ยาว 8-30 ซม. รูปขอบขนานถึงใบหอก ยอดอ่อนมีขนแน่น ยาว 0.5-2 มม. ใบแก่เกลี้ยงทั้งสองด้าน ไม่มีจุดดำหรือตุ่มเล็กๆ ด้านล่าง เส้นกลางใบขนานด้านบน เส้นใบ 9-30 คู่ ขุนด้านบน กิ่งไม่เป็นมุม เมื่ออ่อนมีขนสีสนิม ยาว 0.5-2 มม. แก่จะแตกหรือลอก ดอกเพศผู้ สีแดงสดด้านใน ออกเป็นช่อธรรมดาหรือแตกเป็นง่าม ยาวได้ถึง 10 ซม. มี 3-20 ดอก ก้านดอกยาว 3-6 มม. อดอก กว้างประมาณ 4 มม. ยาว ประมาณ 3 มม. (กว้างมากกว่ายาว) ทรงกลมปลายแบนหรือทรงรูปไข่กลับกว้าง จักสองส่วนสามถึงสี่ส่วนห้า เป็น 3 พู มีขนแน่นสีน้ำตาลด้านนอก จานเกสรเพศผู้ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม. บนเส้นเกสรเพศผู้ สั้น ยาว 1 มม. กลมมีอับเรณู 9-12 อัน ดอกเพศเมียคล้ายดอกเพศผู้ ยกเว้น ช่อดอกมี 2-10 ดอก ก้านดอกยาวได้ถึง 1.5 มม. อดอกขนาด 5-8 มม. ทรงรูปไข่กลับ แยกออกหนึ่งส่วนสามถึงสองส่วนสาม รังไข่มีขนแน่น ยอดเกสรเพศเมีย มี 6-12 พู ก้านเกสรเพศเมียค่อนข้างสั้น ผล กว้าง 1-2.5 ซม. ยาว 1.5-3 ซม. ก้านผลล่ำยาวมากกว่า 0.5 ซม. ทรงกลมถึงรูปไข่ หรือไข่กลับกว้าง มีขนหยาบแน่นสีน้ำตาลอมส้ม ยาว 1-2 มม. พบกระจายในป่าดิบเดิมหรือป่าดิบ-ป่าไผ่ สูงได้ถึง 200 ม. จังหวัดระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z).-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า
ภาพประกอบ: <http://www.npic-surat.com/web/index.php/2013-07-23-06-43-31/-m-o-p-r/myristicaceae-/146-myristicaceae>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

