

ไม้พุ่มหรือไม้พาดพัน สูงได้ถึง 11 เมตร เรือนยอดเปิด แตกแขนงประปราย เปลือก สีนํ้าตาลเข้ม เรียบ หรือแตกเป็นร่องละเอียด เปลือกในสีส้ม คล้ายแป้ง ใบ กว้าง 1.5-10 ซม. ยาว 5-35 ซม. เดี่ยว ออกสลับ แต่ ระบายเดียวบนข้างสั้น ยาวได้ถึง 100 ซม.(เห็นเป็นใบประกอบ) รูปรีแกมขอบขนานหรือกึ่งรูปไข่กลับ ปลาย เรียวแหลมสั้น โคนห้หรือแหลม ปากเบี้ยวเล็กน้อย ขอบเรียบ ยอดอ่อนมีขนกำมะหยี่สีสนิมหรือออกเหลือง ใบแก่เนื้อคล้ายหนังบาง เกลี้ยงด้านบน มีขนเป็นชูยอย่างน้อยบนเส้นใบด้านล่าง เส้นใบด้านข้าง 6-11 คู่ โค้ง เห็นชัดทั้งสองด้าน เส้นใบย่อยเป็นชั้นบันไดจาง ก้านใบยาวได้ถึง 1 ซม. ลำ เรียบหรือโค้งด้านบน มีขนเป็นชูย ไม่มีตาข้าง (แต่จะมีตาอยู่ที่ซอกใบของกิ่งข้าง) หูใบคล้ายเกล็ด ตาหนึ่งอยู่เหนืออีกตาหนึ่ง ร่วงเร็ว ดอก สมมาตร แยกเพศ ดอกตัวผู้และดอกตัวเมียอยู่ต่างต้น ออกเป็นช่อเรียวเล็กไม่แตกแขนง ที่ปลายส่วนยอด กลีบเลี้ยงจัก 5 พู กลีบดอก 5 กลีบ แยกกันไม่มีจานฐานดอก ดอกตัวผู้ขนาดประมาณ 3 มม. มีก้านดอกยาว 2-4 มม. สีเขียวอ่อน ช่อดอกยาว 15-70 ซม. แต่ละดอกออกเป็นกลุ่มแน่นที่ซอกใบประดับเล็ก กลีบดอกใหญ่ กว่าพูกลิบลี้อยู่ เว้าโค้งหรือคล้ายหมวก(คลุมตรงกลางของดอกในตา) เกลี้ยงยกเว้นที่ปลาย เกสรตัวผู้มี 10 อัน แยกกัน เรียงสองแถว(แถวบนยาวกว่า) ล้อมรอบรังไข่เป็นหมันมีขน ดอกตัวเมียขนาด 1.5 มม. ก้านดอกยาว 0.5-1.5 มม. สีออกเหลือง ช่อดอกยาว 10-15 ซม. ดอกออกเดี่ยวๆ มีรังไข่ 2 ช่อง ยาวเกือบเท่ากลีบเลี้ยง มีขนสีน้ำตาลอมส้ม ยอดเกสรตัวเมียแผ่กว้าง ปลายแยก ไม่มีก้านเกสรตัวเมีย ผล กว้างประมาณ 1 ซม. ยาว ประมาณ 0.7 ซม. สีเขียวอ่อน เมื่ออ่อนมีขนสีสนิม ทรงค่อนข้างรีแบน(กว้างมากกว่ายาว) เหนียวคล้ายหนัง แต่ไม่แตกเมล็ดแข็ง แบน พบในป่าดิบ สูงได้ถึง 700 เมตร หรือใกล้น้ำ



ข้อมูลอ้างอิง: การ์ดเนอร์, โฮมอนด์ ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561, 880 หน้า
ภาพประกอบ: ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

