

ลักเคยลักเกลือ

Diospyros sumatrana Miq.

วงศ์ EBENACEAE

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้น

สูงถึง 24 ม. เรือนยอดแน่น เปลือก สีน้ำตาลอมเทาถึงน้ำตาลเข้ม เรียบหรือแตกเป็นแผ่นเล็กบางและแข็ง เปลือกนอกสีส้มอ่อน ชั้นในมีขีดสีแดงและขาว ใบ รูปร่างและขนาดแตกต่างกัน ส่วนมากรูปรีถึงขอบขนาน พบรูปไข่ถึงไข่กลับบ้าง ด้านบนด้านล่างเกลี้ยงหรือมีขนละเอียดสีน้ำตาลโดยเฉพาะเส้นกลางใบ เส้นกลางใบเป็นเส้นด้านบน พบบางที่ขน เส้นใบโค้ง 5-10 คู่ค่อยๆจางหายไปยังขอบใบหรือเป็นวงและเชื่อมกันเป็นเส้นเรียบ ขอบใบขนด้านล่าง เส้นใบย่อยเป็นร่างแหหรือชั้นบันไดจาก ก้านใบยาว 0.3-0.7 ซม.เกลี้ยงหรือมีขนสีน้ำตาล กิ่งสีน้ำตาลเข้มเมื่ออ่อนมีขนแน่นแล้วเกลี้ยง ดอกตัวผู้ดอกเดี่ยวหรือเป็นช่อกระจุกแน่นตามซอกใบมี 3-10 ดอกก้านช่อดอกยาวประมาณ 2 มม. ก้านดอกยาว 1-3 มม. มีขน กลีบเลี้ยงยาว 3-10 ซม.รูปประจักษ์ ปลายจักลึกเกือบถึงโคน เป็นแฉกรูปสามเหลี่ยม 4 แฉกไม่ซ้อนกัน มีขน กลีบดอกยาว 10-17 มม. สีขาวครีมหรือสีอมเขียว โคนเป็นรูปหลอด ปลายจัก $\frac{1}{2}$ กลีบเป็นแฉก 4 แฉก มีขนด้านนอก เกสรเพศผู้ 8-20 อัน (ส่วนมากมี 16 อัน) อยู่เป็นคู่ ไม่มีรังไข่ เป็นหมัน ดอกเพศเมีย ออกเดี่ยวหรือมี 3 ดอก ก้านช่อดอกยาว 2-5 มม.ก้านดอกยาว 1-3 มม. มีขน กลีบเลี้ยงและกลีบดอกเหมือนในดอกเพศผู้ แต่ใหญ่กว่าเล็กน้อย เกสรเพศผู้เป็นหมัน 8-9 อัน เกลี้ยง รังไข่เกลี้ยงหรือมีขน ก้านเกสรเพศเมีย 1 ก้าน ปลายแตกเป็นง่าม ผล กว้าง 1-1.7 ซม. ยาว 1.5-2.5 ซม. ก้านผลสั้น ยาวประมาณ 0.5 ซม.หรือไม่มี ส่วนมากรูปไข่ถึงขอบขนานแกมรี ปลายทั้งสองข้างกลม โค้ง มีสันตื้นๆเมื่ออ่อน มีขนบางแล้วเกลี้ยงและแห้ง สีเขียวอมเทา สุกสีเหลือง กลีบเลี้ยงโอบหุ้มโคนผลหรือกางออก เส้นผ่าศูนย์กลางยาวถึง 2.5 ซม. ปลายจักถึงโคนเป็นแฉกตั้งตรงขึ้น 4 แฉก พับจีบและขอบเป็นคลื่น เมื่ออ่อนมีขนแล้วเกลี้ยง พบทั่วไปและค่อนข้างมาก ในป่าดิบเดิมและป่ารุ่น



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต, ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คปพ.2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์มรดกอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์มรดกอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

