

ไม้ต้นเล็กเป็นพุ่ม สูง 5-10 ม. เปลือกสีน้ำตาลแดงถึงสีเทา มีช่องอากาศจำนวนมาก แตกเล็กน้อย ตัดเปลือกในน้ำเลี้ยวใส ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับหรือออกดกใกล้ปลายกิ่ง รูปไข่กลับ กลมหรือเป็นแฉ่งเล็กน้อย โคนรูปรีแคบขอบเรียบหรือเป็นแฉ่งเล็กน้อย โคนรูปรีแคบขอบเรียบ ยอดอ่อนมีขนแน่น ใบ ใบแก่คล้ายหนังสีเขียวเข้ม เกือบหรือมีขนกระจายบนเส้นใบด้านบน ด้านล่างสีเขียวอมเทาอ่อน มีขนกำมะหยี่และปุ่มกระจายทั่วไปโดยเฉพาะบนเส้นใบ เส้นใบ 9-16 คู่ ฐานด้านบน ชัดด้านล่าง เส้นใบย่อย เป็นร่างแหชัดทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 0.5-1 ซม. ดอก ดอกเล็กสีขาวแกมเขียวอ่อนถึงสีเหลืองอมเขียวอ่อน ดอกแยกเพศและอยู่กันคนละต้น ดอกเพศผู้ใหญ่กว่าดอกเพศเมีย ดอกเพศผู้ออกเป็นช่อแขนงยาวถึง 35 ซม. ที่ปลายกิ่งมีขนแน่น ก้านดอกสั้นมาก กลีบเลี้ยงยาวประมาณ 1.5 มม. รูปถ้วย ปลายเป็น 5 แฉก ด้านนอกมีขนละเอียด กลีบดอก 5 กลีบ รูปขอบขนานแกมไข่ กว้างประมาณ 1.5 มม. ยาวประมาณ 2.5 มม. ซ้อนกัน มีขนสั้น ถึงค่อนข้างเกลี้ยง ด้านนอกมีเส้นตามยาวชัด ประมาณ 8 เส้น เกสร เกสรเพศผู้ 5 อัน อับเรณูรูปไข่ยาวประมาณ 0.5 มม. ในดอกเพศผู้ สั้นกว่าและเป็นหมัน ดอกเพศเมียฐานดอกเป็นวงแหวนมี 5 พู ขนแน่นตรงกลางรังไข่เหนือวงกลีบขนาด 1.5 มม. ไม่พบในดอกเพศผู้ มีขนตรงกลาง มี 1 ช่อง ก้านเดสรเพศเมียแยก 3 แฉกยาวถึง 1 มม. ผล ผลกลม ปลายกลม ยาว 0.7-1 ซม. มีขนกระจาย ต่อไปเกลี้ยง ตั้งอยู่บนฐานดอก รูปกรวยคว่ำ ยาวถึง 1.5 ซม. เรียวเล็กไปยังก้านผลเล็ก ยาวถึง 1.5 ซม. ด้านในนุ่ม มีน้ำยาง ผงผลชั้นในแข็ง ภายในมี 1 เมล็ด พบในป่าถึงผลัดใบบนเขาหินปูน จ.สตูล ปัตตานี



ข้อมูลอ้างอิง : โชนอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต, ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1- กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คป.2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com_dofplant&id=1206&view=showone&Itemid=132