

มะเดื่ออุทุมพร

Ficus racemosa L.

วงศ์ MORACEAE

ชื่อพื้นเมือง : มะเดื่อเกลี้ยง, เตื่อน้ำ, เตื่อใหญ่

ไม้ต้น ไม่อาศัยไม้อื่น ผลัดใบช่วงสั้น สูงได้ถึง 30 ม. เรือนยอดค่อนข้างเปิด กิ่งใหญ่แผ่กว้าง เปลือกสีเทาออก ชมพูถึงน้ำตาลอ่อน เรียบเมื่ออ่อน แก่เริ่มหยาบและมีเกล็ด เปลือกในออกสีชมพู มียางสีครีม ชมพู หรือออกน้ำตาล ใบ กว้าง 3-8 ซม. ยาว 6-20 ซม. ออกสลับเรียงเวียน รูปขอบ ขนานแกมรี ถึงรูปไข่แคบ ปลายทู่หรือแหลม โคนรูปลิ้น พบน้อยโคนกลม ไม่เบี้ยว ขอบเรียบหรือจักห่างๆ โกล้ปลายยอดอ่อนมีขนละเอียด ใบแก่เนื้อคล้ายหนังบาง เกลี้ยงหรือ มีขนกระจายเฉพาะด้านบน มีขนสีขาวละเอียดหรือมีนวล เล็กน้อยด้านล่าง เส้นใบจากโคนยาวประมาณหนึ่งส่วนสี่ ของใบ มักจาง ยาวไปใกล้ขอบ ไม่แตกแขนง มีต่อมไขที่ ซอกใบ เส้นใบข้าง 5-9 คู่ คู่บนๆเป็นวงเป็นร่องด้านบน เส้นใบย่อยคล้ายชั้นบันได ก้านใบยาว 1.5-7 ซม. เกลี้ยง หรือมีขนอ่อนมีสะเก็ด หูใบยาว 0.5-1.2(2) มม. ร่วงเร็ว หรือค่อนข้างติดทน กิ่งต้น มีขนละเอียดเมื่ออ่อน แก่เป็น สะเก็ด ผล ขนาด 3-5 ซม. มีก้านขั้ว ยาว 0.3-1.2 ซม. ออกเป็นช่อแน่น อาจแตกแขนงใหญ่แข็ง ยาวได้ถึง 25 ซม. ออกตามลำต้นและกิ่งใหญ่ ผลทรงกลมหรือรูปลูกแพร์ ปลายแบน หรือบวมเล็กน้อยสีเขียวอมเหลือง สุกสีชมพูส้ม ถึงม่วงแดง มักมีขีด มีขนละเอียด ไม่มีเกล็ดด้านข้าง



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชมอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z).-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ภาพที่ 1-2 http://www.qsbgs.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=1721

ภาพที่ 3. <http://book.baanlaesuan.com/plant-library/ficus-racemosa/>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

