

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้น ไม้อาศัยไม้อื่น ผลัดใบช่วงสั้น สูงได้ถึง 30 ม. เรือนยอดกลม ลำต้นเป็นทรงกระบอก โคนมีพูพอนหนาสูงชันเมื่ออายุมาก เปลือก สีเทาอ่อน เกลี้ยง มีช่องอากาศเล็ก เปลือกในสีน้ำตาลอมส้มอ่อน มียางขาวเป็นน้ำ ใบ กว้าง 6-12 ซม. ยาว 14-28 ซม. ออกสลับเรียงเวียน รูปรีถึงขอบขนานหรือกึ่งรูปไข่กลับปลายทู่หรือแหลมสั้น โคนทู่ถึงกลมหรือกึ่งรูปหัวใจ เท่ากันหรือเบี้ยวเล็กน้อย ขอบไม่จัก ยอดอ่อนมีขนเส้นไหม ใบแก่เนื้อคล้ายหนังค่อนข้างแข็ง เป็นเงาและเกลี้ยงด้านบน เนื้อหยาบซัด (คล้ายกระดาษทราย) แต่ไม่มีขนด้านล่าง เส้นกลางใบนูนเล็กน้อย หรือกึ่งแบน เส้นใบจากโคนใบ 1-2 คู่ เล็กเรียว ยาวไปถึงหนึ่งส่วนสิบถึงครึ่งหนึ่งของใบ เส้นใบข้าง 7-10 คู่ นูนชัดด้านล่าง เป็นวงและเชื่อมกันใกล้ขอบ เส้นใบย่อยคล้ายชั้นบันไดจางละเอียดแต่เห็นทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 3-8 ซม. มักยาวไม่เท่ากันในกิ่งเดียวกัน เป็นร่องด้านบน ไม่เป็นเกล็ด หูใบยาว 1-3 มม. มีขนเส้นไหม ร่วงเร็ว ผล ขนาด 1.8-2.5 ซม. ก้านเล็กเรียวยาว 1-2.5 ซม. (รวมคอผลยาวถึง 1.2 ซม.) ออกเดี่ยวหรือเป็นคู่ที่ง่ามใบใต้แผลใบ ทรงกลมถึงรูปไข่หรือคล้ายลูกแพร์โคนแคบเป็นคอยาว 1.2 ซม. มีขนเล็กสั้นนุ่ม สีเขียวอมเทา แก่สีออกเหลืองอ่อน ใบประดับติดทนที่โคน 2-3 ใบ ยาวประมาณ 2 ซม. พบทั่วไปในป่าภาคใต้ ในป่าดิบหรือป่ากึ่งผลัดใบ สูงถึง 1000 ม. มักพบใกล้ลำน้ำหรือเชิงหน้าผาหินปูน



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอนด์ ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ภาพใบ : <http://tropical.theferns.info/image.php?id=Ficus+callosa>

ภาพผล : http://www.qsbq.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=2618

