

ชื่อพื้นเมือง :

**ไม้ตัน** สูงถึง 30 ม. เรือนยอดแคบไม่เป็นระเบียบ ลำต้นเป็นเสากลม เปลือก สีน้ำตาลอ่อนเทาถึงน้ำตาล ขั้มเรียบหรือแตกเป็นแผ่นหรือเกลี้ด เปลือกในขาวถึง เหลืองอ่อน ใบ ออกสลับหรือเวียนสลับแผ่นแน่น มากรูปรีหรือขอบขนาน กว้าง 4-7 ซม. ยาว 8-16 ซม. ปลายแหลม โคนทู่ถึงรูปลิม ขอบจักซี่ฟินละเอียด ใบแก่ด้านบนสีเขียวเป็นมัน ด้านล่างสีเขียวอ่อนเทา อ่อน เส้นกลางใบแน่นด้านบน เส้นใบ 6-10 คู่ โค้งงำ หอยใบใกล้ขอบใบ เส้นใบย่อยจากด้านบน ชัดด้านล่าง ก้านใบยาว 0.5-1.3 ซม. หูใบเล็กมาก กิ่งสีน้ำตาลอ่อน ถึงสีน้ำตาลแดง เกลี้ยง มักคดไปมา ดอก ยาประมวล 0.5 ซม. ไม่สมมาตร ดอกสมบูรณ์เพศหรือแยกเพศ สีครีมถึงสีขาวหรือค่อนข้างโปร่งแสง มีแต้มสีเขียว ออกเดี่ยวหรือออกเป็นช่อ มีดอกไม้มากนักที่ออกใน ก้านช่อ ดอกสั้น ยาว 0.5-1.5 มม. ก้านดอกยาว 0.5-1 มม. กลีบเลี้ยงจักเป็นพู 5 พู ยาว 1-2 มม. รูปกลมหรือรูปไต ช้อนกัน กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่ ยาวประมาณ 3 มม. ปลายทู่หรือกลม เกสรเพศผู้ 5 อัน ยาว 1-2 มม. ก้านชูอับเรณุแบบคล้ายสายหนัง โคนล่างเชื่อมติดกันเป็นวงรอบฐานฐานดอก มักโคงเข้าในคุ้มเกรสรเพศเมีย รังไข่มีหลายช่อง ค่อนข้างจะในฐานดอกใหญ่นุ่ม สีเขียว ปลายกลวง มีก้านเกรสรเพศเมีย อยู่ตรงกลาง ผลทรงกลมถึงรูปไข่กลับหรือรูปกลูกแพร์ยาว 3-6 ซม. สีเขียวสด สุกสีเหลือง มีปุ่มหนาหรือเปลือกเที่ยวย่น แกมไม่แตก ภายในแน่นและแข็ง มีผนังหุ้ม เมล็ดแข็งคล้ายหิน พบระยะหัวใจทั่วไปในป่าดิบที่ต่ำหรือป่ากึ่งผลัดใบ มักพบที่เชิงเขาทิบปูน



ข้อมูลอ้างอิง : กรมอนามัย ศูนย์ สนับสนุนการอนามัย ขยายอุดม น้ำป่าภาคใต้ เล่ม – ห้องพักริมฟาก 1-กรุงเทพฯ : โครงการอันเนื่องมาจากฯ, 2558. 768 หน้า

ภาพและข้อมูล : <http://www.dnp.go.th/botany/plantdetail.aspx?monthno=201704&monthname=April&language=thai>

ภาษาไทย : <http://crassa.cocolog-nifty.com/blog/2014/10/siphonodon-cela.html>



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

