

มะไฟลิง(จำไทร)

Baccaurea polyneura Hook. f.

วงศ์ PHYLLANTHACEAE

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้น สูงได้ถึง 22(30) ม. แตกไม่เป็นระเบียบ มีพุ่มหนา เปลือก สีครีมอมน้ำตาลถึงน้ำตาลเข้ม แตกเป็นเกล็ด เปลือกในสีแดงอมชมพู ใบ กว้าง 6-12 ซม. ยาว 15-22 ซม. ไม่เป็นกลุ่มที่ปลายกิ่ง รูปไข่ถึงขอบขนานแกมรี ปลายกลมหรือแหลม โคนกลมถึงรูปหัวใจหรือสอบแคบ ยอดอ่อนมีขนเส้นไหม ใบแห้งสีออกน้ำตาล ด้านบนมีขนตามเส้นใบ ด้านล่างมีขนสั้นสีน้ำตาลอมเหลือง ไม่มีจุดต่อม เส้นใบ 7-14 คู่ เส้นใบย่อยเป็นชั้นบันได ก้านใบยาว 1-7 ซม. มีขนสีน้ำตาลอมเหลืองแน่น หูใบยาว 2-10 มม. ปลายแคบแหลม ดอกเพศผู้ ขนาด 1.1-3.3 มม. สีขาวออกเขียวถึงเหลือง เป็นช่อแน่น ยาวได้ถึง 7 ซม. ตามซอกใบหรือขีดใต้แผลใบ (หรือออกตามกิ่งแก่) มี 1.5 ช่อ ใบประดับยาว 0.2-1.3 มม. ก้านดอกยาวประมาณ 0.5 มม. กลีบเลี้ยง 4-6 กลีบ ยาว 0.7-1.5 มม. รูปไข่ เกสรเพศผู้ มี 4-8 อัน ยาวประมาณ 0.5 มม. ก้านชูอับเรณูตั้งหรืองอเป็นเขี้ยว ดอกเพศเมีย ขนาด 2.5-6.5 มม. สีน้ำตาลอมเหลืองมี 1-3 ช่อ ยาวได้ถึง 30 ซม. ตามซอกใบหรือกิ่งแก่ ก้านดอกยาว 2-6 มม. กลีบเลี้ยง 4-5 กลีบ ยาว 0.5-6 มม. รูปไข่ ก้านเกสรเพศเมีย ยาวประมาณ 0.2 มม. ยอดเกสรเพศเมีย ยาว 0.6-0.9 มม. จักเกินครึ่ง ผล กลม กว้าง 1.2-2.8 ซม. สีเหลืองแก่ส้มหรือน้ำตาลอมเหลือง แก่จัดแตกมีขนถึงขนคล้ายไหม เมล็ดมีเนื้อสีแดงอมส้ม พบน้อยในป่าดิบหรือป่าพรุ สูงได้ถึง 600 ม. พบที่จังหวัด พังงา สตูล



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ป่า (นพชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

