

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้พุ่มหรือไม้ต้นเล็ก ไม้ผลัดใบ สูงได้ถึง 12 เมตร ใบ ประกอบแบบขนนกปลายคู่ มีใบย่อย 2-6 คู่ ขนาดและรูปร่างหลายแบบ กว้าง 3-13 ซม. ยาว 6-42 ซม. มักรูปรี หลายใบถึงหุบหรือเรียวยาวแหลม โคนกลมหรือแหลม เกือบทั้งสองด้าน(ในภาคใต้ แต่มักมีขนในต้นที่ขึ้นที่อื่นในไทยและคาบสมุทรมมาเลเซีย) ดอก สีขาว ถึงเหลืองอ่อน กลิ่นหอมหวาน ออกเป็นช่อแคบ ยาวได้ถึง 70 ซม. แกนกลางมีขนบางถึงแน่น กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ยาว 3-10 มม. รูปไข่ถึงขอบขนานแกมรีหรือไข่กลับ โคนคล้ายก้าน ยาว 0.5-2 มม. มักมีขนเส้นไหมด้านใน มีรยางค์เป็นหงอนชัด 2 ระบายค์ เกสรตัวผู้ 8 อัน ล้อมรอบด้วยจานฐานดอกแบน มีรังไข่ 3 ช่อง ผลยาว 1.5-5 ซม. สีเหลืองขุ่นหรือชมพูออกเทา ไม้เป็นพื(หรือพุดินๆ) โคนไม่แคบ ผลแห้งไม่ย่น ผลอ่อนมีขนสั้นนุ่ม ด้านนอกเกลี้ยงหรือมีขนด้านใน เมล็ดใหญ่มี 1-3 เมล็ด สีสน้ำตาลหรือดำมัน พบบ่อยทั่วภาคใต้ ในถิ่นที่อยู่หลายแบบ สูงได้ถึง 1, 200 เมตร มักขึ้นตามชายป่า หรือใกล้ลำน้ำ



อ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไซมอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : สมรพันธ์พรินต์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ภาพใบ/ดอก : http://www.biotik.org/india/species/L/lepitetr/lepitetr_11_en.html

ภาพผล : http://www.phytoimages.siu.edu/imgs/benctar/r/Sapindaceae_Lepisanthes_tetraphylla_26623.html



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

