

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้พุ่ม หรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 12 ม. ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มไม้เป็นระเบียบ ลำต้นอ้วนสั้น เปลือก สีน้ำตาลแดง ถึงเทา เรียบหรือแตกเล็กน้อย ใบ ยาว 15-50 ซม. ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ มีใบย่อย 3-6 คู่ กว้าง 3-7 มม. ยาว 7-22 มม. ใบที่ปลายใหญ่ที่สุด มักห้อย รูปร่างหลายแบบ ก้านสั้น ตาดอก และยอดอ่อนมีขนเส้นไหมสีbronze ใบแก่สีเขียวอ่อน มีขนนุ่มด้านล่าง และบนเส้นกลางใบเท่านั้นด้านบน กิ่งสีน้ำตาลแดง กิ่งอ่อนเป็นร่อง ดอก ขนาดประมาณ 0.6 ซม. สีขาวหรือเหลืองอ่อน กลิ่นหอมหวานออก เป็นช่อตั้งคล้ายช่อ กระจุกแตกแขนง ยาว 25-50 ซม. ที่ปลายกิ่งและที่ง่ามใบบนๆ ดอกเพศเมีย และดอกสมบูรณ์เพศอยู่ที่โคนของช่อและบานก่อน ดอกเพศผู้อยู่ถัดขึ้นไป กลีบเลี้ยงกลม 5 กลีบ กลีบคูนอกเล็กกว่า ช้อนกัน มีขนเส้นไหมด้านนอก กลีบดอก 4(5) กลีบใหญ่กว่ากลีบเลี้ยง โคนแคบ มีเกล็ดที่ขน 1 เกล็ด กับหงอนที่มีรอยบาก 2 รอย ดอกเพศผู้เกสรเพศผู้ 8 อัน มีขน จานฐานดอกมีขอบยกสูง ดอกเพศเมียรังไข่มี 3 พู มีขนแน่น ผล ยาว 1-1.5 ซม. สีส้ม สุกสีแดงเข้มถึงดำอมม่วง ผลอ่อนมีขนละเอียดแล้วเกลี้ยงเนื้อบาง เป็นพู่เล็ก 2-3 พูเมื่อสุกเต็มที่ (บางทีมีเพียง 1 พูที่เจริญ) เมล็ดใหญ่ มี 1 เมล็ดต่อหนึ่งพู สีน้ำตาลถึงดำมัน พบทั่วไปใน ที่ถูกแผ้วถาง และป่ารุ่น



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชมอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า
ภาพประกอบ : [http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Lepisanthes0rubiginosa0\(Roxb.\)0Leenh.](http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Lepisanthes0rubiginosa0(Roxb.)0Leenh.)

