

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้น

สูงถึง 20 ม. เปลือก สีเทาถึงดำ เรียบหรือแตก เปราะ ใบ รูปขอบขนานถึงรูปไข่กลับพบน้อยรูปใบหอก กว้าง 3-8 ซม. ยาว 9-23 ซม. ปลายแหลมหรือเรียวแหลม โคนกลมถึงแหลม ใบแก่เนื้อบาง เกลี้ยง เส้นใบโค้ง 8-15 คู่ แตกแขนงแล้วเชื่อมกันห่างจากขอบใบ ค่อนข้างเป็นร่องด้านบน ฐานล่าง เส้นใบย่อยเป็นชั้นบันได งามด้านบน เห็นชัดด้านล่าง ก้านใบยาว 0.4-1 ซม. ค่อนข้างเกลี้ยง ดอกเพศผู้ ออกเป็นกลุ่มๆ ละ 3 ดอก ก้านช่อดอกยาวถึง 1.5 ซม. มักพบหลายกลุ่มอยู่เป็นกระจุกแน่นตามซอกใบ ก้านดอกยาวประมาณ 2 มม. มีขน กลีบเลี้ยงยาว 2-3 ซม. โคนเป็นรูปประฆัง ปลายจักลึกถึงโคน เป็นแฉก 3 แฉก ไม่ซ้อนกัน ด้านนอกมีขนเส้นไหม ด้านในเกลี้ยง กลีบดอกยาว 5-7 มม. โคนเป็นหลอดปลายจักลึกครึ่งกลีบเป็นแฉก 3 แฉก มีขนตามหลอดและตามกึ่งกลางแฉกด้านนอก ด้านในเกลี้ยง เกสรเพศผู้ 12-14 อัน ขนาดไม่เท่ากัน เกลี้ยง รังไข่เป็นหมันมีขนแข็ง บางที่ไม่มี ดอกเพศเมียออกเป็นช่อกระจุกสั้นมี 3-5 ดอกตามซอกใบ ก้านดอกยาว 5-7 มม. มีขนยาวนุ่มกลีบเลี้ยงและกลีบดอกเหมือนในดอกเพศผู้แต่ใหญ่กว่า รังไข่มีขนสีเข้มแน่น ก้านเกสรเพศเมีย 1 ก้าน ผล กว้าง 0.5-2 ซม. ยาว 0.5-3 ซม. ไม่มีก้านผล รีถึงขอบขนาน พบน้อยที่เป็นรูปไข่ ปลายกลมมีปุ่มสั้นคล้ายหัวนม โคนกลม เมื่ออ่อนมีขนสีน้ำตาลออกเป็นแผ่น เมื่อแก่เกลี้ยงและแข็ง กลีบเลี้ยงมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 ซม. ไม่ชัด ปลายจักถึงโคนเป็นแฉกทางออก 3 แฉก ยาวประมาณ 3 มม. ไม่เป็นจิบหรือขอบเป็นคลื่น มีขนด้านนอก พบในป่าดิบที่ต่ำ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอน ฟินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

