

ไม้ต้น

ไม่ผลัดใบหรือผลัดใบช่วงสั้น สูงได้ถึง 24 ซม. เรือนยอดเป็นพุ่มแน่น ลำต้นมักคดงอ เปลือกสีครีมถึงน้ำตาลอมส้มอ่อน เรียบถึงลอกเป็นแผ่นหรือแตกเป็นร่อง ใบ ยาว 20-45 ซม. มี 3 ใบหรือใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ใบย่อย 1-3(5) คู่ กว้าง 3-8 ซม. ยาว 7-22 ซม. รูปไข่ถึงขอบขนานแกมรีหรือใบหอกกว้างปลายแหลมสั้นหรือเรียวแหลม โคนหู่ถึงกลมหรือแคบ มักเบี้ยวเล็กน้อย ขอบจักชัดถึงเกือบเรียบ ใบอ่อนสีแดงออกน้ำตาล ใบแก่สีเขียวเป็นมันด้านบน เกลี้ยงทั้งสองด้าน เส้นใบ 6-11 คู่ เป็นมุมแหลมโค้งเป็นวงไม่ชัดใกล้ขอบใบ เส้นใบย่อยทำมุมเกือบตั้งฉากกับเส้นกลางใบ คล้ายชั้นบันได เล็กเรียว ฐานเล็กน้อยทั้งสองด้าน ก้านใบข้างยาว 0.3-1.5 ซม. ก้านใบปลายยาวประมาณ 2.5 ซม. ก้านช่อใบยาว 5-11 ซม. ดอกขนาด 0.7-1 มม. ออกเป็นช่อโปร่งแตกแขนง ยาวได้ถึง 25 ซม. ที่ปลายกิ่งและง่ามใบบนๆ มักมีกิ่งพิเศษอีก 2 กิ่งที่โคน เรียบหรือมีตุ่มเล็กๆ ใกล้ข้อ กลีบเลี้ยงขนาด 3-5 มม. ไม่เท่ากัน สีเขียวอมเหลืองถึงส้มอมชมพู ตรงกลางมีขีดสีแดงเข้ม รูปไข่ โค้งนูน คล้ายหนัง กลีบดอกกว้างประมาณ 2 มม. ยาวประมาณ 4 มม. สีครีมถึงส้มอมชมพูอ่อน รูปขอบขนานแกมรี เนื้อคล้ายกระดาษ เกสรเพศผู้ ยาว 3-4 มม. อับเรณูรูปไข่ ขนาดประมาณ 1 มม. จานฐานดอกสีเหลืองถึงส้มอ่อน รังไข่มี 3 ช่อง สีครีมถึงชมพู ผล ขนาด 1.5-2.5(4) ซม. ทรงไข่กลับถึงกลมเบี้ยว หรือค่อนข้างจัก 3 พู เป็นป่าดงดิบ 3 ป่าปลายมีก้านเกสรเพศเมียติดอยู่มากเป็นร่อง ละออง 3 ร่องหรือเส้นแยกเปลือกหนา (2-6 มม.) มี 1-7 เมล็ด ขนาด 2-9 มม. พบในป่าดิบต่ำหรือป่าใหม่ สูงได้ถึง 300 ม. บางที่ขึ้นบนหินปูน



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชมอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z).-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ภาพใบ : <https://www.flickr.com/photos/adaduitokla/13910409599/in/photostream/>

ภาพผล : http://www.phytoimages.siu.edu/imgs/pelserpb/r/Staphyleaceae_Turpinia_sphaerocarpa_97120.html