

ไม้ต้น

ไม้ผลัดใบ สูงถึง 30 ม. ลำต้นบิด เป็นร่อง โคนต้นมีพูพอนสั้นตามอายุ เปลือก สีครีมถึงน้ำตาลอมเทาเงิน หยาบแตกเป็นแผ่นและเกล็ด เปลือกชั้นกลางสีเขียว เปลือกในสีส้มอ่อนถึงอมเหลือง มียางใส หรือสีขาวแทรกอยู่ กลิ่นหอม ใบ มีใบย่อย 2-3 คู่ รูปรีกว้างถึงขอบขนาน กว้าง 2.5-7 ซม. ยาว 5-16 ซม. ปลายค่อยๆ เรียวแหลมเป็นติ่งทู่ยาวประมาณ 1 มม. โคนรูปกลมหรือกลมค่อนข้างเท่ากัน ยอดอ่อนมีขนสั้น สีส้มออกน้ำตาลแน่น ใบแก่บางแข็งถึงค่อนข้างคล้ายหนัง เกลี้ยงและเป็นมันด้านบน มีขนละเอียด อย่างน้อยบนเส้นกลางใบด้านล่าง ใบแห้งสีเขียวอม กากี้ถึงน้ำตาลเทา เส้นใบ 6-13 คู่โค้ง ชัดด้านล่าง เส้นใบย่อยเป็นร่างแหละเอียดบนทั้งสองด้าน ก้านใบย่อย ยาว 0.7-1.7 ซม. (ก้านใบปลายยาวถึง 3.5 ซม.) บวมที่ปลายทั้งสองด้าน มีขนละเอียด ก้านใบใหญ่ยาวถึง 5 ซม. สีออกน้ำตาล โคนบวมและแบนชัดด้านบน ขนละเอียด ดอก ขนาด 0.5 ซม. สีขาวอมเขียว แห้งสีออกดำ ออกเป็นช่อแตกแขนงที่ปลายกิ่งหรือตามซอกใบบนๆ มีขนสั้นน้ำตาลอมส้มแน่น กลีบเลี้ยงยาว 0.5-1 มม. มีขนเล็กน้อย กลีบดอกเกลี้ยง จานฐานดอกเป็นวงแหวน เป็นพูไม่ชัด 6 พู ดอกเพศผู้ ออกเป็นช่อแตกแขนงกว้าง ยาวถึง 12 ซม. กลีบเลี้ยงยาวประมาณ 2 มม. เกสรเพศผู้ติดที่ขอบนอกจานฐานดอกแต่ไม่เชื่อมกัน เกสรเพศเมียเป็นหมันลดรูป ดอกเพศเมียเป็นช่อยาว 4-21 ซม. ผล รูปไข่ กว้าง 0.8-1.3 ซม. ยาว 1.2-2 ซม. ปลายทู่ โคนกลมพบทั่วไปในป่าดิบที่ต่ำ มักขึ้นตามสันเขา สูงถึง 300 ม.



ข้อมูลอ้างอิง : ไชยอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม่ป่าภาคใต้ เล่ม 1. - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์มรดกอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

