

ไม้ต้น สูงถึง 12 เมตร แตกกิ่งต่ำ เรือนยอดแผ่กระจาย ลำต้นคดงอ ไม่มีพุ่มพอง เปลือก สีน้ำตาลอมส้ม เรียบหรือขรุขระ มียาง ใบ เดี่ยว ออกเวียนสลับ รูปไข่กลับ กว้าง 4-10 เซนติเมตร ยาว 7-18 เซนติเมตร ปลาย หูถึงกลมหรือเป็นแฉ่งตื้น โคนรูปลิ้น ขอบเรียบ ใบแก่หนาคล้ายหนัง เป็นมันด้านบน กลี้ยงทั้งสองด้าน เส้นใบ 10-18 คู่ เส้นใบย่อยเป็นร่างแห ก้านใบยาว 1-1.8 เซนติเมตร แบนด้านบน ดอก ยาวประมาณ 1.2 เซนติเมตร สีขาวอมเขียวอ่อน เมื่อแก่เริ่มเป็นสีชมพูมีขีดสีแดง มีกลิ่นหอมแรง ดอกเพศผู้และดอกสมบูรณ์เพศอยู่บนต้น เดียวกัน ออกเป็นช่อแตกแขนงยาวถึง 25 เซนติเมตร ที่ปลายกิ่งและซอกใบบนๆ ก้านดอกยาว 2-5 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยงปลายมีพู่รูปใบหอกแกมรูปไข่ 5 พู่ ยาว 3-5 มิลลิเมตร กลีบดอกรูปแถบแคบ 5 กลีบ ยาว 7-15 มิลลิเมตร จะเริ่มโค้งพับลงโคนซ้อนกัน ขนสั้นนุ่มทั้งสองด้าน เกสรเพศผู้ (8)10 อันยาวถึง 12 มิลลิเมตร อัน หนึ่งใหญ่แข็งและยาวกว่าอันอื่น โคนเชื่อมติดกันเป็นท่อสั้น ไม่มีจานฐานดอก รังไข่ 1 ช่อง กลี้ยง ก้านเกสร เพศเมียเรียวยาว 4-12 มิลลิเมตร ผล กว้างประมาณ 1.6 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3 เซนติเมตร สีเขียวอม เหลืองถึงน้ำตาลอมเทา รูปถ้วยหรือรูปไต มีเมล็ดแข็ง 1 เมล็ดอยู่บนก้านผลบวม มีเนื้อนุ่มสีเหลืองหรือแดง กินได้ ส่วนเมล็ดเมื่อดิบมีพิษ พืชพื้นเมืองของบราซิล ปลูกทั่วไปในภาคใต้ บนดินทราย ใกล้เคียงฝัองทะเล ขึ้นได้กับ สภาพแวดล้อมทั่วไป



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอน พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยาฤดี ไม้ป่าภาคใต้ – พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์มรดกอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

