

ชื่ออื่น :

ไม้ต้น สูงถึง 30 ม. อาจผลัดใบ เรือนยอดแน่นแผ่กว้าง ลำต้นค่อนข้างใหญ่สั่น เปลือกสีน้ำตาลอมเทา อ่อน แตกเป็นร่องตื้น ใบ รูปรีถึงรูปใบหอกแคบ กว้าง 4-9 ซม. ยาว 12-32 ซม. ปลายแหลมถึงเรียวแหลม ถึงรูปลิ้น อาจปลายทู่ ขอบใบเป็นคลื่น ใบอ่อนสีน้ำตาลอมส้ม ใบแก่คล้ายหนังบาง สีเขียวเข้มเป็นมันด้านบน เส้นใบ 12-30 คู่ เล็กเรียว หนูนทั้งสองด้าน เส้นใบย่อยเป็นร่างแหเปิด หนูนเล็กน้อยหรือค่อนข้างจางทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 2-7 ซม. แบนหรือมีร่องด้านบน ดอกสีครีมหรือสีเหลืองออกเขียวอ่อน มีกลิ่นหอม เป็นช่อประมิต แตกหลายแขนง ยาว 10-40 ซม. ตั้งตรงที่ปลายกิ่งหรือตามง่ามใบบนๆ กิ่งใหญ่และก้านมีขนละเอียดหรือพบบ้างที่ค่อนข้างเกลี้ยง ก้านดอกยาว 1-3 มม. กลีบเลี้ยงยาว 2-3.5 มม. มี (4)5 พู มีขนละเอียดโดยเฉพาะด้านบน นอก กลีบดอก (4)5 กลีบ รูปรีหรือขอบขนานแกมรูปไข่ กว้าง 1.5-2 มม. ยาว 3-5 มม. ด้านในมี 3-6 เส้น สีเหลืองจากโคนขึ้นมา 2/3 ของกลีบ (มักเชื่อมกันที่โคน) จานฐานดอกยาวประมาณ 1.5 มม. รูปถ้วยตื้น มีพูคล้ายต่อมระหว่างเกสรเพศผู้ เกสรเพศผู้ 4(5) อัน สมบูรณ์ 1(2) อัน ยาว 2-3 มม. เป็นหมัน 3(4) อัน ยาว 1-1.5 มม. รังไข่รูปไข่เบี้ยวหรือค่อนข้างกลมขนาด 1.5 มม. (เห็นไม่ชัดหรือไม่มีในดอกเพศผู้) สีเหลือง เกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมียติดเนื่องจากศูนย์กลางยาวประมาณ 2 มม. ผล รูปไข่ถึงขอบขนานแกมรูปไข่หรือรูปแบบผล มะม่วง กว้าง 2-10 ซม. ยาว 5-25 ซม. มักเบี้ยว เกลี้ยง สีเขียวถึงสีส้มเหลืองหรือมีสีอมแดงเมื่อสุก เนื้อสี เหลืองหรือสีส้มชุ่มน้ำ มักมีเส้นใย เมล็ดแข็ง มีเส้นใยปกคลุม พบทั่วไปมาเป็นเวลานาน จนไม่ทราบถึงเขตการ กระจายพันธุ์ที่แท้จริง พบในป่าดิบที่ต่ำหรือป่ากึ่งผลัดใบทั่วประเทศ



อ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ ฟินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม – พิมพ์ครั้งที่ 1-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปฟ. 2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : <http://tropical.theferns.info/image.php?id=Mangifera+indica>

