

Knema andamanica (Warb.) W.J.de Wilde

มะม่วงเลือด

วงศ์ MYRISTICACEAE

ชื่อพื้นเมือง :



ไม้ต้น

เล็ก สูง 6-16 ม. เปลือก สีครีมถึงน้ำตาลเข้ม เรียบหรือค่อนข้างขรุขระ เปลือกในสีชมพูเข้ม มีน้ำเลี้ยงสีแดงประปราย ใบ กว้าง 2-8 ซม. ยาว 8-30 ซม. รูปหอกขนานถึงใบหอก มีขนแน่นเมื่ออ่อน แล้วค่อยๆเกลี้ยง แต่มีรอยแผลเล็กๆ ที่ขนร่วงไป เส้นกลางใบแบนหรือนูนเล็กน้อยด้านบน เส้นใบ 14-24 คู่ แบนหรือนูนเล็กน้อยด้านบน เส้นใบย่อยเป็นร่างแหละเอียดแต่ชัด กิ่งมีขนละเอียดแน่นเมื่ออ่อน ไม่ช้าจะเกลี้ยง ไม่แตกหรือลอก บางที่เป็นสะเก็ดหรือริวหยาบ ดอกเพศผู้สีเหลืองอ่อนถึงออกชมพูด้านใน ออกเป็นช่อคล้ายปุ่ม มี 3-15(30) ดอก ก้านช่อดอกยาว ยาวได้ถึง 5 มม. มีขนละเอียด ก้านดอกยาว 3-9 มม. อดอกกว้าง 2-4.5 มม. ยาว 2.5-6 มม. รูปไข่กลับ จักครึ่งหนึ่งถึงสองส่วนสาม เป็น 3 พู เกสรเพศผู้เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-3 มม. บนเส้าเกสรเพศผู้ยาว 1-3 มม. มีอับเรณูเป็นวง 6-12 อัน ดอกเพศเมียเหมือนดอกเพศผู้ยกเว้น ก้านดอกยาวประมาณ 6 มม. อดอกกว้างประมาณ 2.5 มม. ยาวประมาณ 6 มม. รูปขอบขนานแกมไข่ ผล กว้าง 1.2-1.6 ซม. ยาว 1.8-2 ซม. ก้านผลยาว ยาวได้ถึง 0.7 ซม. ทรงรีไม่มีสัน มีขนคล้ายขนแกะชัด ยาว 0.2-1 มม. พบน้อยในป่าดิบเดิมและป่ารุ่น สูงได้ถึง 500 ม.

ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไทมอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

