

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้พุ่มสูง 0.5-1.5 ม. พบน้อยไม้ต้นสูงได้ถึง 11 ม. ดอก ส่วนใหญ่แยกเพศพบน้อยดอกสมบูรณ์เพศ กิ่งอ่อนแตกแขนงในข้อปล้องที่สามขนาดความกว้าง 2-4.5 มม. ก้านใบหลักยาว 1.5-7 ซม. ใบรูปไข่ถึงรูปไข่กลับ มีขนแบบกำมะหยี่ บริเวณหลังใบและมีขนประปราย บริเวณเส้นกลางใบและเส้นใบย่อย ใบยาว 4-9.5 ซม. ยาว 2-3.8 ซม. ช่อดอกออกบริเวณซอกใบ ยาว 6 ซม. ก้านช่อดอกยาว 0.1-2.5 ซม. แตกแขนงจากน้อย ไปมาก ก้านช่อดอกย่อยยาว 0.6-2 มม. แต่ในดอกที่เป็นผล ยาว 2.5-4 มม. มีขนก้านดอกประปราย กลีบเลี้ยง เชื่อมติดกันฐานรองดอก ผิวของกลีบเลี้ยงด้านนอกมีขน ผล ผลเดี่ยว กลีบดอกกว้าง 2-3.5 มม. เกสรเพศผู้มี 4 อัน ดอกเพศสมบูรณ์เพศ กว้าง 1.5-2.5 ซม. ดอกเพศผู้กว้าง 1.5-2 มม. ดอกเพศผู้สั้นโยนน้อย ดอกสมบูรณ์เพศปลายป้านหรือแหลม วงเกสรเพศเมียเกลี้ยงไม่มีขน ช่องรังไข่มี 5-8 มม. ผล เกลี้ยง เมล็ดขนาด 4-5 มม. พบบริเวณป่าเปิดที่ระดับความสูงจากน้ำทะเล 500-700 ม. ในมณฑลยูนนาน ลาว มาเลเซีย และประเทศไทย



อ้างอิง : http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=250084126

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์พันธุ์พืชแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์พันธุ์พืชแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

