

ไม้พุ่ม หรือไม้ต้นเล็ก สูงได้ถึง 15 ม. เปลือก สีนํ้าตาลอ่อนถึงสีเทา เรียบหรือแตกสะเก็ดเปลือก ในสีครีมหรือสีเหลืองอ่อน ใบ กว้าง 3-8 ซม. ยาว 10-25 ซม. อาจพบกว้างได้ถึง 25 ซม. ยาวได้ถึง 55 ซม. รูปขอบขนานหรือรูปรี แฉก ปลายเรียวแหลม โคนแหลมถึงกลม หรือค่อนข้างเป็นรูปหัวใจ ด้านบนเกลี้ยง ยกเว้นบนเส้นใบ ด้านล่างมีขนหยาบสีน้ำตาลอมเหลืองทั่วไป เส้นใบหลักเป็นร่องด้านบน เส้นใบย่อยอยู่ชิดกัน ก้านใบยาว 0.2-0.8 มม. มีขนหยาบหนาแน่น หูใบขนาด 6-15 มม. แฉก มักติดทน ดอก ออกเป็นช่อไม่แตก กิ่ง ตามซอกใบ แกนกลางมีขนหยาบ กลีบเลี้ยงจักลึกถึงโคนกลีบ เป็นพูแฉก 5-8 พู บางทีพูขนาดไม่เท่ากัน มีขนหนาแน่นทั้งสองด้าน ดอกเพศผู้ขนาด 2-3 มม. มีก้านดอกมากกว่า 1 มม. ช่อดอกยาว 5-15 ซม. จานฐานดอกคล้ายหมอน เกลี้ยง ล้อมรอบโคนก้านชูอับเรณูและรังไข่เป็นหมัน เกสรเพศผู้มี 4-8 อัน ยาว 1.5-3 มม. รังไข่เป็นหมันยาวน้อยกว่า 0.5 มม. จัก 3 พู มีขนถึงเกลี้ยง ดอกเพศเมียขนาด 1.5-2.5 มม. ก้านดอก ยาวยาวน้อยกว่าหรือเท่า 1.5 มม. ช่อดอกยาว 3-13 ซม. จานดอกสั้นกว่าพูกลีบเลี้ยงเกลี้ยงหรือมีขนเล็กน้อย ตามขอบ รังไข่มีขน ก้านเกสรเพศเมียติดที่กึ่งปลาย มียอดเกสรเพศเมียโค้ง 3-5 อัน ผล ขนาด 4-7 มม. ก้าน ผลยาว 2-6 มม. ออกเป็นช่อ 6-15 ซม. รูปรีเบี้ยวหรือรูปเลนส์ แบนข้าง มีก้านเกสรเพศเมียติดที่ด้านข้างชัด พบทั่วไป ในป่าดิบและป่ารুন สูงถึง 1200 เมตร ส่วนใหญ่ในที่ชื้นได้ร่มเงา



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอนด์ ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z).-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

