

ชื่อพื้นเมือง :



ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงถึง 36 ม. เรือนยอดรูปขอบขนานแน่น ลำต้นสูงตรง เปลือก สีเทาอ่อนถึงน้ำตาลแดง ขรุขระถึงแตกเป็นร่องตื้นและเป็นเกล็ด เปลือกในสีแดง มีกลิ่นฉุนสนแรง มีน้ำเลี้ยงสีขาว เหนียว ใบ ออกเวียนหรือเวียนรอบข้อแหลม รูปขอบขนานแกมรีถึงรูปไข่กลับแคบ กว้าง 6-14 ซม. ยาว 14-35 ซม. ปลายทุ่ถึงกลมหรือปลายเป็นแฉ่งตื้น โคนรูปกลมถึงค้อยๆสอบแคบ ใบแก่เนื้อหนาแข็ง สีเขียวเข้มเป็นมันด้านบน ไม่มีเส้นใยคล้ายเส้นผมเมื่อหัก เส้นใบ 14-28 คู่ มีเส้นแฉมระหว่างคู่เส้นใบ โค้งใกล้ขอบ หนูนชัดด้านล่าง เส้นใบ ย่อยจาง ก้านใบยาว 2.5-6 ซม. กลมด้านบน มีปีกที่ส่วนบน โคนบวม ดอก สีชมพูหรือแดง ไม่หอม ออกเป็นช่อ ปิระมิดแตกแขนง ยาว 10-40 ซม. (อาจกว้างถึง 18 ซม. ยาวถึง 48 ซม. ในต้นกล้า) ที่ปลายกิ่งหรือตามง่ามใบ บนทุกดกค่อนข้างแน่น กิ่งใหญ่และก้านสีทองแดงถึงสีแดงเข้ม เกสรตัวผู้ ก้านดอกยาวประมาณ 1.5 มม. กลีบเลี้ยง ยาว 3-5 มม. มี 5 พู สีแดงเข้ม เกสรตัวเมียหรือพบบ้างที่มีขนนุ่มด้านบนนอก กลีบดอก 5 กลีบ รูปใบหอกแคบ กว้าง 1.5-2.5 ซม. ยาว 7-10 ซม. ด้านในมี 3 สัน สีเหลืองจากโคนขึ้นมาครึ่งกลีบ เมื่อแรกตั้งตรงแล้วโค้งลง โคน เชื่อมติดกับจานฐานดอกที่ลดลงเป็นก้านสั้นระหว่างกลีบดอกและเกสรเพศผู้ เกสรเพศผู้สมบูรณ์ 1(2) อัน ยาว 6-10 มม. เกสรเพศผู้เป็นหมัน (3)4 อัน ยาว 3-5 มม. ก้านชูอับเรณูสีชมพู อับเรณูสีม่วงแดง รังไข่กลมขนาด 1-1.5 มม. สีเหลือง เกสรตัวเมีย ก้านเกสรเพศเมียติดเยื้องจากศูนย์กลางยาว 5-7 มม. ผล รูปไข่เบี้ยวหรือขอบขนาน กว้าง 7.5-10 ซม. ยาว 6-7 ซม. (ในพันธุ์ปลูก กว้าง 12 ซม. ยาวถึง 18 ซม. ) ใบแบนหรือแบนเล็กน้อย เปลือก หนา สีเขียวอมเทา สุกสีเหลือง เนื้อสีเหลือง มีเส้นใยจำนวนมากเปรี้ยวหรือหวานเมื่อสุกงอม มีกลิ่นคล้ายฉุนสนแรง เมล็ดใหญ่ มีเส้นใยแข็ง พบในป่าดิบที่ต่ำพบปลูกทั่วไปโดยเฉพาะตามจังหวัดใกล้ชายแดนมาเลเซีย

ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชมอน พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : <https://florafaunaweb.nparks.gov.sg/special-pages/plant-detail.aspx?id=3012>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

