

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้พุ่มหรือไม้ต้นเล็ก พบน้อยที่สูงได้ถึง 20 ม. เปลือก สีน้ำตาล แตกแนวตั้ง มีเส้นใย เปลือกในสีแดง ใบ กว้าง 2-5 ซม. ยาว 4-10 ซม. รูปไข่ ปลายกลมหรือเว้า โคนกลมรูปหัวใจหรือกึ่งรูปไข่ ปลายและโคนแหลม ยอดอ่อนสีอมชมพู มีขน ใบแก่สีเขียวเข้ม เกือบหรือมีขนตามขอบใบและบนเส้นกลางใบด้านล่าง เส้นกลาง ใบแบน เส้นใบ 6-7 คู่ เส้นใบย่อยเป็นร่างแหละเอียด ก้านใบยาว 0.2-1.2 ซม. เมื่่ออ่อนมีขน หูใบขนาด 3-6 มม. รูปแถบแคบ ร่วงเร็ว ดอก ออกเป็นช่อแตกกิ่งก้านมาก ที่ซอกใบ แกนกลางมีขนสีสนิม กลีบเลี้ยงแยก 4-6 กลีบ ขนาดน้อยกว่า 1 มม. มีขนด้านนอก ด้านในเกลี้ยง ดอกเพศผู้ ขนาด 2-3 มม. ไม่มีก้านดอก ช่อดอกยาว 4-8 ซม. จานฐานดอกจักเป็นพู แยกกัน 4-6 พู เกือบ เกสรเพศผู้มี 4-6 อัน ยาวประมาณ 2 มม. รังไข่เป็น หมัน มีขน ดอกเพศเมีย ขนาด 1.5-2 มม. ก้านดอกยาวน้อยกว่า 1 มม. ช่อดอกยาว 2-3 ซม. จานฐาน ดอก รูปถ้วย สั้นกว่ากลีบเลี้ยง เกือบหรือมีขนที่ขอบ รังไข่มีขน ก้านเกสรเพศเมียเกลี้ยง ติดเยื้องที่ปลาย ยอดเกสรเพศเมียมี 3 (หรือ 2-5) อัน ผล กว้างประมาณ 3 มม. ยาวประมาณ 4 มม. ก้านผลยาวน้อยกว่า 1 มม. ช่อผล ยาว 4-7 ซม. กลมหรือรูปเลนส์ ก้านเกสรเพศเมียติดที่ปลายผล ไม่เปรี้ยว มีขน พบตามชายป่า ด้านหลังป่าชายเลน และป่าชายหาด



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอนด์ ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : ธรินทร์พรวิไลแอนด์พับลิชชิง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า
ภาพประกอบ : <https://loraflora.web.nparks.gov.sg/special-pages/plant-detail.aspx?id=3545>