

ไม้พุ่มหรือไม้ต้นเล็ก พบน้อยที่สูงได้ถึง 17 ม. สีสน้ำตาลอมเทาถึงสีน้ำตาลเข้ม เรียบหรือแตกหยาบๆ ใบกว้าง 5-12 ซม. ยาว 15-30 ซม. อาจพบได้กว้างถึง 25 ซม. ยาวได้ถึง 55 ซม. รูปร่างค่อนข้างรูปไข่กลับ หรือรูปไข่ปลายเรียวแหลมยาวหรือแหลม โคนแหลมหรือรูปหัวใจ ยอดอ่อนมีสีสนิมหนาแน่นใบแก่มีขนสีสนิมอย่างน้อยที่สุดบนเส้นใบด้านบน ด้านล่างมีขนสีสนิมทั่วไป เส้นใบแบนหรือเป็นร่องตื้นด้านบน มีได้ถึง 22 คู่ อยู่ชิดกัน เส้นใบย่อยเป็นชั้นบันได ชิดกัน ก้านใบยาว 0.3-1.5 มม. มีขนหนาแน่นอย่างน้อยเมื่ออ่อน หูใบ ติดทน ขนาด 6-25 มม. แฉกแหลม หรือรูปคล้ายเคียว กว้างประมาณ 10 มม. ยาวประมาณ 35 มม. คล้ายใบ ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบ แกนกลางมีขนสีสนิม กลีบเลี้ยงจุกถึงโคนกลีบ เป็นพู 4-6 พู กว้าง 0.5-1 มม. มีขนด้านนอก ด้านในเกลี้ยง ดอกตัวผู้ประมาณ 1.5 มม. ไม่มีก้านดอก ออกเป็นช่อไม่แตกกิ่งช่อดอกยาว 6-14 มม. พบน้อยที่มี 2-3 ช่อ อยู่ด้วยกัน ดอกแน่นอยู่ชิดติดกัน จานฐานดอกคล้ายหมอน เกลี้ยงหรือมีขน ล้อมรอบโคนก้านเกสรตัวผู้และรังไข่เป็นหมัน เกสรตัวผู้มี 4-6 อัน ยาวประมาณ 1 มม. รังไข่เป็นหมันยาวประมาณ 0.3 มม. มีขน ดอกตัวเมียขนาด 1.5-2 มม. ไม่มีก้านดอกหรือก้านดอกสั้น ยาวได้ถึง 0.5 มม. ช่อดอกยาว 10-30 ซม. จานฐานดอกสั้นกว่ากลีบเลี้ยง แต่เห็นได้ชัด เกลี้ยงหรือมีขน รังไข่มีขนแน่น ก้านเกสรตัวเมียติดที่กิ่ง ปลาย ยอดเกสรตัวเมียมี 3-8 อัน สีแดงสด ผล กว้าง 5-8 มม. ยาว 9-15 มม. (พบน้อยที่กว้างถึง 9 มม. ยาวได้ถึง 20 มม. ก้านผลยาว 23 มม. ออกเป็นช่อยาว 10-35 มม. คล้ายผลมะม่วง บางทีโคนเบี้ยวเห็นชัด มีก้านเกสรตัวเมียติดที่ด้านข้างหรือค่อนข้างปลายปลายมักเป็นจอย มีขนเมื่ออ่อน

-พบทั่วไปในป่าดิบที่ต่ำ ริมฝั่งแม่น้ำ ป่าพรุน้ำจืด การ์ดเนอร์, ไซมอน



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไซมอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z).-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ: <http://npic-surat.com/web/index.php/2013-07-23-06-43-31/-prs/phyllanthaceae-euphorbiaceae/156-phyllanthaceae-euphorbiaceae?showall=1>