

# *Diospyros malabarica* var. *siamensis* (Hochr.) Phengklai

มะพลับทะเล

EBENACEAE

ไม้ต้น สูงถึง 18 เมตร ใบ รูปขอบขนานแกมรี พบข้างรูปไข่หรือรูปใบหอกกลับ กว้าง 3-8 เซนติเมตร ยาว 10-24 เซนติเมตร ปลายแหลมหรือหูดุ โคนหูดหรือกลม เนื้อหนาค่อนข้างเหนียว เกลี้ยง เส้นใบเล็ก 6-10 คู่ ห่างไม่เท่ากัน ทำมุมแหลมชัน โค้งและไปเชื่อมกันเป็นวงห่างจากขอบใบ ค่อนข้างนูน เส้นใบย่อยเป็นร่างแหห่าง เห็นไม่ชัด ก้านใบยาว 1-1.5 เซนติเมตร เกลี้ยง ใบแห้งด้านล่างสีน้ำตาลเข้ม ดอกเพศผู้เป็นกลุ่มแน่นยาวถึง 0.5 เซนติเมตร ตามซอกใบบนๆ หรือตามกิ่งที่ไม่มีใบ มี 3-9 ดอก ก้านดอกยาว 2 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยงยาว 2-3 มิลลิเมตร ปลายจักลึกครึ่งกลีบเป็นแฉก 4(5) แฉก ไม่ซ้อนกัน มีขน กลีบดอกยาว 0.7-1.5 มิลลิเมตร สีเหลืองอ่อน โคนเป็นรูปคนโท ปลายจักลึกครึ่งกลีบ เป็นแฉก 4(5) แฉกเกลี้ยง แต่มีแถบขนตรงกลางแฉกด้านนอก ด้านในเกลี้ยง เกสรเพศผู้ 24-48 อัน มีขน รังไข่เป็นหมัน มีขน ดอกเพศเมียเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8-2.5 เซนติเมตร ออกเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม 3-5 ดอก ตามซอกใบก้านดอกยาวถึง 0.5 เซนติเมตร มีขน กลีบเลี้ยงเหมือนในดอกเพศผู้แต่ใหญ่และจักลึกกว่า กลีบดอกยาว 1.5-2 เซนติเมตร รูปประฆังกว้าง คล้ายดอกเพศผู้ เกสรเพศผู้เป็นหมัน 8-12 อัน รังไข่มีขน ก้านเกสรเพศเมียมี 4-6 อัน ยอดเกสรเพศเมียมีหลายพู กลีบเลี้ยง มีขนสีเข้ม ดอกเพศเมียและผลมีกลีบเลี้ยงตรง ผลขนาด 4-6 เซนติเมตร ก้านผลใหญ่ยาวถึง 1 เซนติเมตร กลม ปลายทั้งสองกลมและบวม เมื่ออ่อนมีขน แก่เกลี้ยง สีส้มสดถึงน้ำตาลแห้งเมื่อสุก เปลือกหนา ภายในมียาง มี 3-8 เมล็ด เอนโดสเปิร์ม ย่น กลีบเลี้ยงมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3.5 เซนติเมตร จักเป็นแฉกครึ่งหนึ่งถึงสามส่วนสี่ของกลีบเป็นแฉกรูปสามเหลี่ยม 4(5) แฉก ขอบเป็นคลื่นหรือม้วน พับจีบ ขนแน่น พบในภาคใต้



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอนด์ พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยาฤดี ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : <http://tropical.theferns.info/image.php?id=Diospyros+malabarica>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

