

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้น สูงถึง 6-30 เมตร ไม่ผลัดใบหรือผลัดใบช่วงสั้น เรือนยอดแน่น กิ่งต่ำๆ ห้อยลง เปลือก สีน้ำตาลอมส้มถึงสีน้ำตาลออกม่วงเข้ม เรียบหรือแตกเป็นร่องตื้นหรือเป็นแผ่น เปลือกในสีชมพูอมส้มถึงสีน้ำตาลอมแดง ใบ เดี่ยว ออกตรงข้าม แผ่นใบ รูปรีแคบถึงรูปใบหอกแกมขอบขนาน กว้าง 12.4 ซม. ยาว 4-12 ซม. ปลายเรียวแหลม พบน้อยที่ปลายทู่ โคนแหลม ขอบเรียบ ใบอ่อนสีม่วง ห้อยเป็นพู่ไหวอ่อน ใบแก่หนาคล้ายแผ่นหนัง สีเขียวเข้มขุ่นด้านบน ด้านล่างสีอ่อนกว่าหรือสีออกเทาเกลี้ยงทั้งสองด้าน มีกลิ่นฉุนเมื่อขยี้ใบ เส้นกลางใบนูนด้านบน เส้นใบ 8-16 คู่ เล็กเรียว จมด้านบน นูนด้านล่าง เส้นใบย่อยเป็นร่างแหละเอียด จางทั้งสองด้าน ก้านใบเล็กเรียว ยาว 0.7-1.5 ซม. กิ่งเล็กเรียว ตามข้อมักแบน สีน้ำตาลเข้ม เกลี้ยง ทุกรูปทรงแคบ ยาว 5-10 มม. ดอก ยาวประมาณ 3 มม. เล็ก สีขาวถึงสีเหลืองอมเขียวอ่อน ดอกเพศผู้และดอกสมบูรณ์เพศอยู่บนต้นเดียวกัน ออกเป็นช่อ แตกแขนงยาวถึง 25 ซม. ที่ซอกใบหรือปลายกิ่ง ก้านดอกยาวประมาณ 2 มม. กลีบเลี้ยงปลายมีแฉก รูปไข่กว้าง 3-5 ซม. พูยาวประมาณ 1 มม. กลีบดอกรูปขอบขนาน 3-5 กลีบ ยาวประมาณ 2 มม. ไม่เท่ากัน มีสันตรงกลาง เกสรเพศผู้ที่สมบูรณ์ 3-5 อัน ยาวประมาณ 1.5 มม. ติดรอบจานฐานดอกเล็กแบน รังไข่เหนือวงกลีบยาวประมาณ 1 มม. มี 1 ช่อง มีก้านเกสรเพศเมียสั้นติดตรงกลาง ผล รูปไข่หรือไข่กลับ ยาว 2.5-3.5 ซม. สุกสีเหลืองถึงส้ม เกลี้ยง เปลือกบาง มีเนื้อ ผนังผลชั้นในแข็ง ภายในมี 1 เมล็ด เนื้อนุ่ม กินได้ พันธุ์ป่ามักมีรสเปรี้ยว พบทั่วไปในป่าดิบที่ต่ำถึงสูง 600 ม. ปลูกตามบ้าน



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชยอน พินดา สิทธิสุนทร ก่องกานดา ชยามฤต ไม่ป่าภาสได้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปฟ. 2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวนวัฒนกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

