

ชื่อพื้นเมือง :

ปาล์มกอ สูงได้ถึง 15 ม. เส้นผ่านศูนย์กลางต้น 30 ซม. มีรอยกาบใบเป็นวงเห็นได้ชัด ต้นแตกหน่อห่าง ใบ ใบประกอบแบบขนนก 12-15 ทาง กาบใบแยกเล็ก ขอบกาบใบเป็นเส้นแห้งแข็ง สานกันเป็นร่างแห สีดำ บางครั้งเปลี่ยนเป็นเส้นแหลม ยาวได้ถึง 1 ม. ก้านใบอ้วนยาว 60-90 ซม. แผ่นใบยาว 8-10 ม. ปลายห้อยลง มีใบย่อยได้มากถึงด้านละ 100 ใบ ใบขนาด 6-9 * 100-150 ซม. ใบรูปใบหอก เรียงกันเป็นกลุ่ม และเรียงต่าง ระบายกัน ไม่เป็นระเบียบ ใต้ใบสีเทาเงิน ขอบใบเป็นคลื่น ปลายใบห้อยลงและหยัก ดอก ช่อดอกออก ระหว่างกาบใบ 3-4 ช่อ เจริญจากโคนขึ้นไปหาปลาย ช่อดอกรวมกันยาวได้ถึง 1.50 ม. ก้านช่อดอกอ้วนและ ชีตั้งขึ้น ยาว 75 ซม. ช่อดอกยาว 60-75 ซม. ห้อยลง แตกกิ่งย่อยแผ่ออกจำนวนมาก ยาว 45 ซม. ผล รูปรี ขนาด 3-4*5-6 ซม. มี 1-4 เมล็ด ผลแก่สีเหลือง เมล็ดยาวรีและแบนสีดำ การกระจายพันธุ์และ นิเวศวิทยา พบในป่าขึ้นทางภาคใต้ ที่ความสูง 500-800 ม. เหนือระดับน้ำทะเล แถบจังหวัดสงขลา ปัตตานี นราธิวาส และยะลา กระจายพันธุ์ในเขตชายแดนไทย-มาเลเซีย เกาะชวา และเกาะสุมาตรา ข้อสังเกต มะพร้าวหนูมีลักษณะคล้ายกับฉก (A. pinnata) และรังกับ (A. westerhoutii) ต่างกันที่สองชนิดหลังเป็น ปาล์มลำเดี่ยวช่อดอกมีขนาดใหญ่มากและห้อยลง แต่มะพร้าวหนูนั้นแตกช่อดอกจากด้าน ล่างขึ้นด้านบนไปเรื่อยๆ โดยที่ต้นแม่ไม่ตายเหมือนชนิดอื่น



ข้อมูลอ้างอิง : พจนานุกรม วิชาการ. ปาล์มและปรงในประเทศไทย-กรุงเทพฯ: บ้านและสวน, 2548. 271 หน้า

ภาพประกอบ : <http://tropical.ferns.info/image.php?id=Arenga+obtusifolia>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

