


ชื่อพื้นเมือง :

ไม้พุ่ม

เล็ก สูงถึง 12 ม. เปลือก สีครีมถึงน้ำตาล แตกเป็นแผ่นตื้น เปลือกในสีส้ม มียางมาก ใบ กว้าง 4.5-8 ซม. ยาว 15-26 ซม. (ยาวน้อยกว่า 3 เท่าของความกว้าง) รูปใบหอกแกมขอบขนาน ปลายแหลมกว้างถึงสอบเรียว โคนทุติงกลมหรือค่อนข้างเป็นรูปหัวใจ เนื้อคล้ายหนัง สีเขียวเข้มด้านบน มีขนละเอียด โดยเฉพาะที่โคนเส้นกลางใบด้านล่าง เส้นใบเล็ก 13-18 คู่ มีเส้นสันแซมระหว่างกลาง โค้งและไปเชื่อมกันใกล้ขอบใบ โดยเฉพาะช่วงบน ค่อนข้างนูน ก้านใบใหญ่ยาว 1-1.8 ซม. ขนแน่นโคนเป็นปีกปิดตายอด กิ่งใหญ่มี 4 สันหรือร่องแห้งสีออกเหลือง มีขนที่ปลาย ดอกเพศผู้ยาว 1 ซม. สีเขียวอ่อนถึงครีม กลมหรือรูปประฆัง ออกเป็นช่อกระจุกแน่น มีหลายดอกบนปุ่มเล็กแข็งตามกิ่งใต้ตาใบ ก้านดอกยาวถึง 0.4-1 ซม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ อาจพบ 4-6 กลีบ ยาว 3-5 มม. กลม มีขน กลีบดอก 5 กลีบ ยาว 7-9 มม. ไม้ค้อยบาน กลมหรือรูปไข่ ปลายทุ่ เกสรเพศผู้ประมาณ 40 อันอยู่ด้วยกันเป็น 5 มัดล้อมจานฐานดอก นุ่มเป็นลอนไม่มีเกสรเพศเมียเป็นหมัน ดอกสมบูรณ์เพศยาว 1.2 ซม. กลิ่นเปรี้ยว ออกพร้อมต้นแต่ต่างช่อ ก้านดอกยาว 0.5 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกคล้ายในดอกเพศผู้ เกสรเพศผู้ 5 มัด แต่ละมัดมี 1-4 อัน ติดสลับกับแฉกของฐานดอก 5 แฉกนุ่ม รังไข่ 5 ช่อง รูปไข่หรือกลม ยอดเกสรเพศเมียใหญ่ มีรังไข่ 5 แฉก ผล ยาว 4-6 ซม. ก้านผลใหญ่กลมหรือแบน ยาว 0.5-1 ซม. มีร่องต้นตามแนวตั้ง 5-8 ร่อง หรือเป็นสันโดยเฉพาะส่วนบน ปลายทั้งสองด้านกลมหรือป้อม มียอดเกสรเพศเมียเล็ก 5 แฉกติดที่ก้านเกสรเพศเมียซึ่งยาว 1-2 มม. เนื้อนุ่ม สุกสีเขียวสดเป็นมันถึงเหลืองอ่อน แห้งสีน้ำตาลมันถึงดำและย่นซัด เมล็ดใหญ่ 1-5 เมล็ด มีเนื้อหนาสีส้ม กินได้แต่เปรี้ยวมาก พบในป่าดิบที่ต่ำตามเชิงเขาหินปูน



ข้อมูลอ้างอิง : ไชยอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม่ป่าภาคใต้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : ภาพด้านซ้าย : <https://florafaunaweb.nparks.gov.sg/special-pages/plant-detail.aspx?id=2925>

ภาพด้านขวา : <https://www.flickr.com/photos/adaduitokla/15093402780/in/photostream/>