

ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 2 เมตร หรือบางที่เป็นไม้ต้นเล็กทรงพุ่ม สูงได้ถึง 4 ม. ใบ กว้าง 3-5 ซม. ยาว 10-16 ซม. พบน้อยกว้างได้ถึง 7 ซม. ยาวได้ถึง 24 ซม. รูปร่างหลายแบบ แต่ส่วนมากรูปขอบขนานแกมรี ปลายทั้งสองด้านแหลมหรือเรียวแหลม ยอดอ่อนมีขนละเอียด ใบแก่เนื้อคล้ายหนังบาง เกือบมีปุ่มเล็กๆทั้งสองด้านเมื่อแห้ง เส้นใบ 5-8 คู่ มักนูนด้านล่าง เส้นใบย่อยละเอียดมาก ก้านใบยาวน้อยกว่า 0.5 ซม. ดอก ยาวประมาณ 0.5 ซม. สีเหลืองอ่อนหรือสีส้ม ดอกสมบูรณ์เพศ ออกเป็นช่อคล้ายช่อกระจัง ไม่แตกแขนง ยาว 2-5 ซม. ที่ง่ามใบ ช่อเดี่ยวหรือมีได้ถึง 8 ช่ออยู่ด้วยกัน แกนกลางช่อเล็กเรียว เกือบมีปุ่มเมื่ออ่อนมีใบประดับช่อดอกยาว 4-7 มม. ช่อสั้นหุ้มไว้ ดอกมีก้านช่อดอกยาว 1-2 มม. มี 3 ดอก ตามซอกใบประดับ และร่วงไปทันทีเมื่อดอกบาน กลีบรวมจักเป็นพูลึก มีหลอดกลีบสั้น ยาวประมาณ 1 มม. และมีพูกลีบ 4 (พบน้อย 3 หรือ 5) พู กางออก อยู่บนจานฐานดอก บวมพอง เกสรเพศผู้ ยาวเท่าหลอดกลีบรวม โคนหลอดติดรอบขอบฐานดอกที่จักเป็นพูไม่สม่ำเสมอ รั้งไขขนาดประมาณ 1 มม. รูปไข่แคบ ก้านเกสรเพศเมียสั้น ยอดเกสรเพศเมียจักตื้น 4 พู ผล กว้าง 0.6-1 ซม. ยาว 1-1.6 ซม. สีส้มอ่อนถึงแดงสด รูปไข่ มีจานฐานดอกหนาที่โคน ผนังบาง ด้านในฉ่ำน้ำ ผนังหุ้มเมล็ดเปราะ ก้านผลยาว 2-3 ซม. แกนกลาง ช่อผลมัก บวมและนุ่ม พบในภาคใต้ ตามเรือนยอดชั้นรองของป่าดิบและป่ารุ่น



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชมอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรทางชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรทางชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

