

ไม้ต้น

ขนาดเล็ก สูงได้ถึง 12(20) ม. เรือนยอดเป็นพุ่มกลม กิ่งตัน (ไม่มีมดอาศัยอยู่) ใบ กว้าง 6-18 ซม. ไม่จักเป็นพู(อาจมีปลายแหลมสั้น 3 ปลาย) รูปไข่ ปลายแหลมหรือเรียวแหลม โคนกลม ก้นปิดโดยมีก้านใบติดลึกจากขอบใบ 4 ซม. ขอบจักซี่ฟันเล็ก แต่ขอบไม่โค้งกลับ ยอดอ่อนมีขนคล้ายเส้นไหมละเอียด ใบแก่คล้ายกระดาษหรือหนังบาง ด้านบนสีเขียวชุน ด้านล่างสีเทาอมฟ้าจาง(มีนวล) มีต่อมเล็กสีเข้มหรือสีทอง ก้านใบยาว 5-20 ซม. มีนวล มีขนละเอียดอย่างน้อยที่ปลายยอด หูใบยาว 10-25 มม. ปลายเรียวแหลม ดอก เพศผู้ เป็นช่อแตกแขนงแคบยาว 10-20 ซม. ตามง่ามใบ ใบประกบคล้ายหูใบ ยาวได้ถึง 8 มม. ที่โคนกิ่ง ใบประกอบย่อย กว้างได้ถึง 3 มม. ยาวได้ถึง 6 มม. สีเขียวอ่อนปลายรุ่งริ่งเข้าในเนื้อคล้ายกระดาษมักติดทน มีดอก6(14) ดอกต่อหนึ่งระดับย่อย ก้านดอกยาว 1-1.5 มม. กลีบเลี้ยงแยก เกสรเพศผู้มี6-7 อัน ดอกเพศเมียมีช่อแตกแขนงน้อยกว่า นอกนั้นคล้ายดอกเพศผู้ ผลกว้างประมาณ 10 มม. ยาวประมาณ 6 มม.(เฉพาะตัวผล) ก้านผลยาว 2 มม. ออกดอกไปทางปลายยอด มีใบประดับคล้ายใบขอบจักซี่ฟัน ช่อห้อยยาว 4-16 ซม. มีพูต้น2(3) พู ด้านบนมีหนามเล็กเรียวยาวได้ถึง 14 มม. มีผงเหนียวสีเทาอ่อนหรือสีออกเหลืองอยู่ทั่วไป ยกเว้นบนหนามกลีบเลี้ยงเล็กที่โคน ปลายมีก้านเกสรเพศเมียเล็กเรียวยาว 5 มม.-พบในป่ารุ่นและช่องว่างในป่าดิบที่ต่ำ



ข้อมูลอ้างอิง : ไชยอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองการดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้-พิมพ์ครั้งที่ 1.- กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2559. 792 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

