

ไม้ต้นเล็ก สูงได้ถึง 10 ม. แตกกิ่งด้านข้าง เปลือก สีน้ำตาลอ่อน เป็นสันและแตกละเอียด ไม่แตกเป็นแผ่น เปลือกในสีครีม ใบกว้าง 6.2-14.4 ซม. ยาว 15-35 รูปร่างรูปไข่กลับ โคนกลมหรือรูปลิ้น (พบบ้างที่ค่อนข้างเป็นรูปหัวใจ) ยอดอ่อนมีขนที่แตกกิ่งเป็นเกล็ดหนาแน่น ใบแก่เนื้อคล้ายแผ่นกระดาษ มักมีขนคล้ายเส้นไหมกระจาย ด้านข้างไม่มีต่อม เส้นใบ 11-15 คู่ ก้านใบยาว 1.1-5 ซม. มีขนคล้ายเส้นไหม หูใบกว้าง 2-5 มม. ยาว 8-16 มม. ดอกเพศผู้ขนาด 1.5-3 มม. สีเขียวอมเหลือง ออกเป็นช่อยาวได้ถึง 18 ซม. ตามกิ่งแก่หรือขีดใต้แผลใบ (พบน้อยตามซอกใบ) มี 1-8 ช่ออยู่ด้วยกัน ใบประดับยาว 1.5-6 มม. ก้านดอกยาว 1.7-2.2 มม. กลีบเลี้ยงมี 3-6 กลีบ กว้าง 0.5-1.4 มม. ยาว 0.5-2 มม. เกสรเพศผู้มี 5 อัน ยาว 0.5-1 มม. ก้านชูอับเรณูงอเป็นเขี้ยว ดอกเพศเมียขนาด 5-7 มม. ออกเป็นช่อเดี่ยวยาวได้ถึง 20 ซม. ตามลำต้นหลักหรือตามกิ่งแก่ (พบน้อยตามซอกใบ) มี 1-3 ช่ออยู่ด้วยกัน ก้านดอกยาว 0-4.5 มม. กลีบเลี้ยง 4 กลีบ กว้าง 2-3 มม. ยาว 4-6 มม. ยอดเกสรเพศเมียขนาด 1 มม. ผล ขนาด 1.4-2 ซม. ออกเป็นช่อเล็กเรียวยาวคล้ายเชือก ยาว 7-30 ซม. สีขาวถึงสีแดงอมชมพู ทรงกลม เปลือกบาง เมื่อแก่ไม่แตก เกลี้ยงถึงมีสีขาวส้นหนาแน่นด้านนอกด้านในเกลี้ยง เมล็ดขนาด 8-13 มม. มีเนื้อสีฟ้าใส กินได้ พบในป่าดิบเดิมและป่ารุ่น สูงได้ถึง 700 ม. มักพบใกล้ลำน้ำหรือป่าพรุน้ำจืดพบที่ จ. ตรัง ถึง นราธิวาส



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ ดินดา สิวธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต, ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.- กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2559 792 หน้า.

ภาพประกอบ : ภาพผล : <http://www.nationalherbarium.nl/Euphorbs/specB/Baccaurea.htm>

ภาพใบ : <https://florafaunaweb.nparks.gov.sg/special-pages/plant-detail.aspx?id=4001>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

