

ชื่อพื้นเมือง :



ไม้ต้น

ต้น ผลัดใบ สูงได้ถึง 20 เมตร เปลือกสีเทาอ่อน แตกเล็ก หนา ใบ กว้าง 5-9 ซม. ยาว 15-22 ซม. ออกเป็นกลุ่มที่ปลายกิ่ง รูปใบหอกกลับ ถึงรูปช้อน ปลายทู่ถึงกลมหรือเป็นแฉ่งเล็ก สอบแคบ ไปยังโคน เนื้อคล้ายหนัง ด้านบนเกลี้ยง มีขนแน่น แล้วเกลี้ยง ด้านล่าง เส้นใบ 13-22 คู่ ตรงและขนานกัน เส้นใบย่อยเล็กเรียวเป็นร่างแห หรือชั้นบันไดไม่เป็นระเบียบ ก้านใบยาว 1.8-2.5 ซม. ใหญ่ล้าขนละเอียด ด้านบนมีร่องเล็กไปยังปลาย โคนหนา กิ่งใหญ่ล้า เส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 1 ซม. มีแผลใบชัด มีขนสีน้ำตาลแดงเมื่ออ่อน ดอก ออกใกล้ปลายกิ่ง ก้านดอก ยาว 2-3.5 ซม. เล็กเรียว มีขนละเอียด กลีบเลี้ยง 4 กลีบ กว้างประมาณ 6 มม. ยาวประมาณ 10 มม. กลีบดอกจากกลีบ 2/3 ของกลีบ ออกเป็น 16 แฉก กว้างประมาณ 3 มม. ยาวประมาณ 10 มม. เกสรทั้งสองด้าน ยกเว้นระหว่างเกสรตัวผู้ด้านใน เกสรตัวผู้สมบูรณ์ประมาณ 34 อัน อับเรณูรูปใบหอก ยาวประมาณ 3 มม. ก้านชูอับเรณูเล็กเรียวยาวประมาณ 3 มม. เกสรทั้ง 2 รังไข่มีขนสีน้ำตาลแดงแน่น ก้านเกสรตัวเมียยาว 2.5-3 ซม. เกสรทั้ง 2 ผล ขนาดประมาณ 2 ซม. กลมแบน หรือกึ่งรูปไข่กลับ(กว้างกว่ายาว) โคนมีกลีบเลี้ยงติดทน มีขนแน่นสีน้ำตาลอมส้ม พบในป่ากึ่งป่าดิบ บนเขาหินปูน โดยเฉพาะใกล้ชายฝั่ง



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชมอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

