

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้น สูงได้ถึง 30 ม. เส้นผ่านศูนย์กลางโตได้ถึง 25(30) ซม. เปลือกเรียบ หรือแตกเป็นแผ่นเล็กน้อย สีน้ำตาลหรือสีเขียวย่นถึงเทาอ่อน เปลือกด้านในสีน้ำตาลอ่อนถึงค่อนข้างแดง เนื้อไม้สีน้ำตาลถึงค่อนข้างแดง หรือสีขาวถึงเหลืองส้ม กิ่งอ่อนมีขนสั้นหนานุ่ม ใบเลี้ยงรูปไข่แคบ มีขนคล้ายไหมประปรายเมื่อยังอ่อน ก้านใบคล้ายทรงกระบอก เป็นร่องตื้นที่แกนของก้าน มีขนหยาบแข็งแน่น หรือเกือบเกลี้ยง โคนก้านใบ ป่องเล็กน้อย ใบรูปรีแคบหรือไข่กลับแคบ กว้าง 2-7.5 ซม. ยาว 7-26 ซม. ฐานใบมนถึงรูปลิ้น ขอบใบเรียบ หรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ปลายใบเป็นติ่งแหลมหรือมีส่วนยื่นคล้ายหาง ใบค่อนข้างบาง เรียบ มน ไม่เปราะ เมื่อแห้งสีเขียวย่น เทาถึงเกือบดำด้านบน น้ำตาลอ่อนด้านล่าง เส้นกลางใบและเส้นแขนงใบมีขนสั้นหนานุ่มด้านบน เกือบเกลี้ยง หรือมีขนประปรายด้านล่าง เส้นกลางใบเรียบถึงเป็นปุ่มเล็กน้อยด้านบน และนูนชัดด้านล่าง เส้นแขนงใบ 8-15 คู่ เส้นแขนงใบย่อยเรียงเป็นรูปคล้ายขั้นบันได ช่อดอกออกตามง่ามใบหรือตามใต้ใบ เกสรเพศผู้ อยู่เป็นกลุ่ม 1-7 อัน มีขนสั้นคล้ายเส้นไหม ก้านดอกยาว 2-4 มม. ใบประดับกว้าง เป็นรูปคล้ายสามเหลี่ยม มีขนแน่นด้าน นอก เกือบด้านใน ก้านดอกเล็กมาก ดอกเพศผู้ มีกลีบเลี้ยง 4 กลีบ รูปไข่แคบ ดอกเพศเมียมีกลีบเลี้ยง 4 กลีบ รูปไข่ มีขนด้านนอก ด้านในมีขนเฉพาะที่ฐาน ผลทรงรี บางครั้งกลม กว้าง 4-6(10) มม. ยาว 8-12 มม. ไม่มี ลาย ไม่มีจอย มีขนคล้ายไหมประปราย ผนังหนา 0.5-1 มม. มีเนื้อบาง มี 1(2) เมล็ด เป็นรูปครึ่ง ทรง กระบอกหรือคล้ายรูปไข่ ขนาดกว้าง 4-5 มม. ยาว 6-8 มม. หนา 2-4 มม. พบได้ทั้งในป่าดั้งเดิมและป่ารุ่น พื้นราบหรือเป็นกลุ่มเป็นตอนเล็กน้อย สั้นเขา เนินเขา หุบเขา ยอดเขา ที่ลาดชันและยอดเขา และใกล้ริมฝั่ง แม่น้ำ ความสูง 10-1,200 ม.



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โจนอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 890 หน้า

ภาพประกอบ : http://www.asianplant.net/Phyllanthaceae/Aporosa_subcaudata.htm



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

