

ชื่อพื้นเมือง

ไม้ต้น สูงได้ถึง 16 เมตร เมื่ออ่อนมีลำต้นหลักลำต้นเดี่ยว เปลือก สีน้ำตาลอมส้มอ่อนถึงสีน้ำตาลเข้ม เรียบหรือแตกเป็นแผ่น เปลือกในสีส้มอมชมพูมีขีดสีเข้ม ใบ กว้าง 3-8 ซม. ยาว 10-20 ซม. รูปรีหรือรูปขอบขนาน ปลายแหลมสั้น โคนห่อถึงแหลม ขอบเป็นคลื่นหรือมีซี่ฟันกลมตื้น ยอดอ่อนมีขนละเอียด ใบแก่เนื้อหนา คล้ายหนัง ด้านบนเกลี้ยงหรือมีขนเล็กน้อยไปยังโคนก้านใบ ด้านล่างมีขนหยากกระจาย ไม่มีต่อมที่โคนใบหรือใบด้านล่าง แต่มีต่อมใหญ่ตามขอบใบเป็นระยะ 6-9 คู่ โค้งด้านบนจางลงโดยเฉพาะด้านล่างก้านใบยาว 1-2.5 ซม. มีขน ป่องชัดที่ปลายและโคน มีขนอ่อน หูใบรูปไข่ ยาว 7-10 มม. ร่วงเร็ว ดอกตัวผู้สีเหลืองอ่อน ขนาด 2-3 มม. ออกเป็นช่อยาว 1.4-5.7 ซม. มี 1-3 ช่อตามซอกใบ ไม่มีดอกที่โคนช่อดอก นอกนั้นออกเป็นกลุ่มต่างๆมี 6-10 ดอกตามซอกใบประดับที่มีขนาดประมาณ 1.5 มม. จะค่อยๆอยู่ชิดติดกันไปยังปลาย ก้านดอกเล็กมาก กลีบเลี้ยง 4 กลีบ ยาว 1.2-1.5 มม. เป็นสัน เกสรตัวผู้มี 3-4 อัน ยาว 2-3 มม. โพล์พันกลีบเลี้ยงเห็นชัด ไม่มีรังไข่เป็นหมัน ดอกตัวเมียขนาด 2-3 มม. มีสีเหลืองอ่อน ออกเป็นช่อยาว 0.5-0.9 ซม. มีถึง 9 ดอก ออกเป็นช่อ 1-2 ช่ออยู่ด้วยกัน ก้านดอกยาวประมาณ 1 มม. กลีบเลี้ยงมี 4 กลีบ ยาว 0.8-1.2 มม. แผ่กว้างรังไข่ 2-3 ช่องมีขนละเอียด เกสรตัวเมียยาว 0.8-1.2 มม. ปลายจักเป็นง่ามลึก ผล ขนาด 1-2.2 ซม. รูปรีหรือเกือบกลม ปลายไม่มีจงอย โคนไม่แคบ มีขนกระจาย แก่แตกไม่เป็นระเบียบ แต่ละส่วนและแกนกลางผลเกลี้ยง เมล็ดขนาด 7-9 มม. มีเนื้อสีเหลืองสด พบกระจายในป่าดิบ สูงได้ถึง 900 เมตร



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชมอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z).-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

