

ไม้พุ่มหรือไม้ต้นเล็กถึงขนาดกลาง เปลือก สีน้ำตาลอ่อน ขรุขระเล็กน้อย เปลือกในสีครีมหรือเหลืองอ่อน ใบ กว้าง 1-4.5 เซนติเมตร ยาว 3-10 เซนติเมตร รูปรี ปลายแหลมหรือเรียวแหลม สอดเรียวไปยังโคนแคบ ขอบจักซี่ฟันตื้นถึงชัด มีต่อมตามขอบ ใบแก่เนื้อคล้ายหนัง สีเขียวเข้มช่นด้านบน ด้านล่างสีเขียวอมเทา มีเส้นใบ สีเขียวเข้ม เกือบทั้งสองด้าน เส้นใบ 5-8 คู่ อยู่ห่างกัน เป็นวงไม่ชัดและเชื่อมกันเป็นเส้นขอบใบจางๆ ใกล้ขอบ ใบ (ห่างน้อยกว่า 5 มิลลิเมตร) เส้นใบย่อยเป็นร่างแหละเอียดถึงค่อนข้างหยาบ หนูนทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 0.3-1 เซนติเมตร กิ่งอ่อนเกลี้ยงหรือเกือบเกลี้ยง ดอก ออกเป็นช่อไม่แตกแขนง (ช่อกระจจะ) ยาว 1-6 เซนติเมตร มีใบประดับหลายใบที่โคน ดอกน้อยถึงจำนวนมาก เกือบหรือมีขนละเอียด ใบประดับยาว 2-5 มิลลิเมตร ร่วงเร็ว กลีบเลี้ยงขนาด 0.5-1.5 มิลลิเมตร สีเขียวหรือแดงอมม่วง มีขนละเอียดหรือเกลี้ยง ยกเว้นตามขอบ กลีบดอกยาว 5-8 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้มี 25-40 อัน รังไข่ขนาด 1-2 มิลลิเมตร เกือบหรือมีขน ก้านเกสรเพศเมียเกลี้ยง ผล กว้าง 0.3-0.6 เซนติเมตร ยาว 0.6-1 เซนติเมตร รูปไข่ถึงขอบแกว่งก้นกลม คอยาว มีกลีบเลี้ยงติดทนที่ปลาย เนื้อบาง แห้งเปราะ ผนังผลชั้นในย่นตื้น เมล็ดโค้ง 1 เมล็ด พบในป่าที่ต่ำที่ยังไม่ถูกทำลายมากนัก ป่าดิบเขา สูง 300-1,700 เมตร พบน้อย จ.ระนอง นครศรีธรรมราช



ข้อมูลอ้างอิง : การ์คเนอร์, โชมอน. ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z).-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : <https://www.herbarium.gov.hk/subpages.aspx?id=2944>

