

ไม้พุ่มหรือไม้ต้นเล็กเรียว สูงได้ถึง 15 เมตร กิ่งคดไปมา เปลือกสีเทาเรียบ ใบ กว้าง 2-4 ซม. ยาว 5-12 ซม. อยู่ในระนาบเดียวกัน (บางทีออกสลับบนกิ่งหลัก) มักห้อยลง รูปรีหรือใบหอก ปลายเรียวแหลม โคนแหลม ถึงกลม ขอบเป็นแฉ่งถึง ค่อนข้างเรียบ มีต่อมห่าง ๆ ตามขอบ ใบแก่เนื้อบาง เกือบด้านบน มีขนละเอียด กระจายโดยเฉพาะบนเส้นใบ หรือค่อย ๆ เกือบด้านล่าง เส้นกลางใบเป็นแฉ่งด้านบน เส้นใบ 5-8 คู่ งามทั้ง 2 ด้าน เส้นใบย่อยเป็นร่างแหหยาบ ก้านใบยาว 3-7 มม. สั้น มีขน กิ่งอ่อนมีขนกระจายแล้วเกลี้ยง ตา มียอดอ่อน ดอก สีขาว กลิ่นเปรี้ยว ออกเป็นช่อกระจุกแน่น แตกแขนงบ้าง ยาวได้ถึง 2.5 ซม. มักมีหลายช่อเป็นกลุ่ม ที่ง่ามใบ มีขน ก้านดอกยาว 1-5 มม. ใบประดับยาวได้ถึง 1 มม. พูกีบเลี้ยงมีขนาดไม่น้อยกว่า 1 มม. หรือบางทีใหญ่กว่า คล้ายกลีบเลี้ยง มีขนหรือเกลี้ยง กลีบดอกยาว 2.5-5 มม. เกือบหรือมีขนเล็กสั้นใกล้โคน ผล กว้าง 0.5 ซม. ยาว 0.8 ซม. ทรงขวดแก้วกันกลม โค้ง สุกสีขาวแล้วเป็นสีน้ำเงิน เนื้อบาง ผนังผลชั้นในแข็ง ย่น มีร่องสั้น 10 ร่อง หรืออาจมากกว่า เมล็ดหยาบเป็นพู 1 เมล็ด พบกระจายในป่าดิบเดิมและป่ารุ่น ทั้งที่ต่ำและสูง จ.ตรัง ปัตตานี



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองการดา ขามดุด, ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1- กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์ฉบับใหม่. 2559. 792 หน้า.

ภาพประกอบ : ภาพใบ : www.flickr.com/photos/reubenlim/ by Reuben C. J. Lim

ภาพผล : <https://www.biolib.cz/en/image/id310089/>

