

ชื่อพื้นเมือง

ไม้พุ่ม หรือไม้ต้น สูงได้ถึง 25 ม. เปลือก สีน้ำตาลอ่อน เกือบหรือมีรอยแผลเป็นปุ่มตามกิ่ง ใบ กว้าง 4-6 ซม. ยาว 10-16 ซม. รูปขอบขนานหรือรูปรี หรือถึงรูปไข่ ปลายเรียวแหลมหรือแหลม โคนทู่แหลม หนามัน คล้ายหนัง เกือบทั้งสองด้าน เส้นใบแบนหรือเป็นร่องตื้น เส้นใบย่อยเป็นร่างแหละเอียด เส้นร่างขนาคัด ก้านใบ ยาว 1-2 มม. โคนและปลายค่อนข้างป่อง เมื่ออ่อนมีขน หูใบขนาดประมาณ 2 มม. แคบ ร่วงเร็ว ดอกออกเป็น กลุ่มไม่แตกแขนงได้ผลใบ (พบน้อยดอกเพศผู้ออกตามซอกใบ) ก้านช่อดอกมีขนสีขาว กลีบเลี้ยงจักลึกครึ่ง หนึ่งของกลีบ เป็นพูสามเหลี่ยม 3-5 พู เกือบหรือมีขน ดอกเพศผู้ขนาด 1-2 มม. ไม่มีก้าน ช่อดอกยาว 3-5 ซม. มีได้ถึง 10 ช่ออยู่ด้วยกัน จานฐานดอกจัก 3-4 พู แยกกัน มีขน เกสรเพศผู้มี 3-4 อัน ยาว 1-2 มม. รังไข่ เป็นหมันซ่อนอยู่ในขนที่คลุมจานฐานดอก ดอกเพศเมียขนาด 1-2 มม. ก้านดอกยาวน้อยกว่า 0.5 มม. ช่อดอก ยาว 1-4(9) ซม. มีถึง 4 ช่อ จานดอกสั้นกว่ากลีบเลี้ยง มีขนสั้นโดยเฉพาะที่ขอบ รังไข่เกือบก้านเกสรเพศ เมียติดที่ปลาย ยอดเกสรเพศเมียมี 4-6 อัน ผล 6-8 มม. ก้านผลยาว 0.5-3 มม. ออกช่อ 4-9 ซม. รูปเลนส์ค่อนข้าง เบี้ยว แบน ก้านเกสรเพศเมีย ติดด้านข้างหรือค่อนข้างปลาย เกือบ พบในป่าดิบที่ต่ำ ป่าพรุน้ำจืด ขอบป่า ชายเลน จ. ระนองตรัง



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอนด์ ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อนุรักษ์พันธุ์พืชและสวนพฤกษศาสตร์, 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : <http://crassa.cocolog-nifty.com/blog/2014/07/antidesma-buniu.html>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

