

ชื่อพื้นเมือง :



ไม้ต้น สูงถึง 24 เมตร ลำต้นที่โคนเป็นปึก เปลือก สีเทาเข้มถึงดำ เรียบหรือแตกเป็นแผ่นหรือเป็นร่อง มีเส้นใย เปลือกในสีครีม ใบ รูปขอบขนานหรือเกือบรูปไข่กลับ กว้าง 5-10 ซม. ยาว 14-30 ซม. ปลายทู่หรือเรียวแหลมสั้น โคนทู่หรือกลม เนื้อคล้ายหนัง เกลี้ยง เส้นใบโค้ง 12-20 คู่ ค่อยๆ จางไปยังขอบใบ เป็นร่องด้านบน เส้นใบย่อยเป็นชั้นบันได ชัดด้านล่าง ก้านใบยาว 0.8-1.7 ซม. ขนเกลี้ยง ดอกเพศผู้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 ซม. เป็นช่อกระจุกตามซอกใบหรือใต้ระดับใบเล็กน้อย มีหลายดอก ไม่มีก้านดอก กลีบเลี้ยงยาว 4-5 ซม. ปลายจักลึกเป็นแฉก (4)5 แฉกไม่ซ้อนกัน มีขนเส้นไหม กลีบดอกยาว 10-14 มม. สีเหลืองครีมถึงสีอมเขียว โคนเป็นรูปหลอด ปลายจักลึกครึ่งหนึ่ง กลีบเป็นแฉก 4-5 แฉก มีขนด้านนอก เกสรเพศผู้ 10-18 อัน รังไข่เป็นหมัน มีขน ดอกเพศเมีย เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.8 ซม. ออกเดี่ยวหรือ 3 ดอก ไม่มีก้านดอก กลีบเลี้ยงและกลีบดอกเหมือนในดอกเพศผู้ แต่ใหญ่กว่า เกสรเพศผู้ เป็นหมัน 4-12 อัน รังไข่มีขนแน่น ผล ขนาด 2.5-3.5 ซม. ไม่มีก้านผล กลมหรือรูปไข่ ปลายกลมและบวม โคนกลม มีขนแน่นเมื่ออ่อน เมื่อสุกแห้ง เมล็ดมี น้อยกว่า 10 กลีบเลี้ยงเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-3 ซม. โอบหุ้มโคนผล ปลายจักถึงโคนเป็นแฉกตั้งตรง 5 แฉก เป็นจีบและขอบเป็นคลื่น เส้นกลีบจาง มีขน พบน้อยในป่าดิบที่ต่ำ

ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอน ฟินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม่ป่าภาสได้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปพ. 2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : ภาพใบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพผล : <https://florafaunaweb.nparks.gov.sg/special-pages/plant-detail.aspx?id=3945>



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

