

Hunteria zeylanica (Retz.) Gardner ex Thwaites

มูกเขา

วงศ์ APOCYNACEAE

ชื่อพื้นเมือง :



ไม้ต้น ไม้ผลัดใบ สูงได้ถึง 20 ม. เรือนยอดค่อนข้างแน่นและแตกกิ่งไม่เป็นระเบียบ เปลือกสีน้ำตาลอมเทาหรือน้ำตาลอมเหลือง เกือบหรือมีรอยแตกเล็กๆ มีช่องอากาศตามแนวรอบขนาดใหญ่ เปลือกในสีครีมหรือสีน้ำตาลอมเหลือง มียางใส ใบ รูปรีแคบหรือรูปขอบขนาน กว้าง 2.5-6 ซม. ยาว 7-18 ซม. ปลายเรียวแหลม โคนสอบหรืออาจกลม ขอบเป็นคลื่นหรือค่อนข้างโค้งกลับ ใบแก่สีเขียวอ่อนหรือเขียวอมเหลือง เนื้อบางคล้ายหนังเกลี้ยง เส้นใบบาง มี (14) 20-30 คู่ ตรงเป็นมุมฉากกับเส้นกลางใบ ไปเชื่อมกันห่างจากขอบใบประมาณ 2 มม. เป็นเส้นขอบใบ ก้านใบยาว 0.7-1.3 ซม. มีปลอกคล้ายหุ้มใบระหว่างคู่ใบ ดอก สีขาวหรือขาวอมเขียว ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งหรือที่ง่ามใบบนๆ ช่อดอกยาว 2-5 ซม. แกนช่อเกลี้ยง ก้านดอกย่อยยาว 2-4 มม. กลีบเลี้ยงยาว 1-2 มม. รูปไข่เกลี้ยง กลีบดอกรูปคล้ายดอกเข็ม หลอบกลีบเรียว ยาว 6-12 มม. พองออกใกล้ปลายรอบๆ เกสรเพศผู้ด้านนอกเกลี้ยง ด้านในมีขนที่ตอนบนของหลอดกลีบ พุกกลีบ ยาว 2-8 มม. เรียงซ้อนไปทางซ้าย เกสรเพศผู้ติดที่ใกล้ปลายหลอด ไม้โผล่พ้นหลอดกลีบ ก้านเกสรเพศผู้ยาวประมาณ 1 มม. อับเรณูไม่เชื่อมติดกับปลายยอดเกสรเพศเมีย รังไข่ขนาดประมาณ 1 มม. เกือบไม่มีจานฐานดอก ก้านเกสรเพศเมียเรียวยาว 5-7 มม. ผล กว้าง 1-3 ซม. ยาว 1.5-3.5 ซม. สีเหลืองอมเขียว เมื่อแก่สีส้ม รูปกลมหรือรูปไข่ โคนแคบคล้ายเป็นก้าน มักออกเป็นคู่ แต่ไม่แตก มีเนื้อด้านใน มี 2 เมล็ด พบทั่วไปในภาคใต้ ในป่าที่ถูกรบกวน ความสูง 700 ม. พบข้างบนเขาหินปูน

ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไจมอน พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2558. 768 หน้า
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

