

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้พุ่ม

เล็กหรือไม้ต้นเล็ก สูง 2-6 ม. แตกกิ่งก้านห่างๆ กันตามแนวนอน เปลือก สีน้ำตาลเข้มถึงสีอมเทา ค่อนข้างรุ้งรุ้ง เปลือกในสีเหลืองถึงแดงเข้ม ใบ กว้าง 3-4 ซม. ยาว 7-11 ซม. รูปร่างรูปใบหอก ปลายเรียวแหลม โคนสอบ ค่อนข้างเบี้ยว เนื้อบาง สีเขียวด้านบน ด้านล่างสีอมเทา ทั้งสีเขียวอมสีก็ เส้นใบคู่ประมาณ 8 คู่ ระยะห่าง 7-18 ซม. ค่อนข้างตรงและเชื่อมกันเป็นเส้นเรียบขอบใบค่อนข้างนูน เส้นใบย่อยเล็กเป็นชั้นบันได เป็นแอ่งไม่สม่ำเสมอ และมีเส้นย่อยเล็กๆ เป็นร่างแหละเอียดจาง ก้านใบเล็ก ยาว 0.8-1.3 ซม. ปลายเป็นปีกเล็ก กิ่งเล็กสีน้ำตาลเข้ม ดอก ดอกเพศผู้สีส้มอ่อนถึงแดงเข้ม ออกเดี่ยวหรือ 2-3 ดอกอยู่ด้วยกันที่ซอกใบและปลายกิ่ง ก้านดอกแข็งยาว 2-4 มม. กว้างไปยังปลาย ใบประดับ 1-3 ใบ กลีบเลี้ยง 4 กลีบยาว 4-5 มม. ไม้เท่ากัน สีส้มหรือแดง เนื้อคล้ายหนัง ขอบบาง กลีบดอก 4 กลีบ สั้นกว่ากลีบเลี้ยง รูปไข่กลีบแนบกัน เนื้อบาง ร่วงเร็ว เกสรเพศผู้ประมาณ 15 อันอยู่แน่นเป็นก้อนแบนตรงกลาง ดอกไม่มีเกสรเพศเมียเป็นหมัน ดอกเพศเมียไม่พบ ผล รี ยาว 5 ซม. ไม่มีก้าน ผลปลายแหลม เมื่อยังอ่อนแล้วเริ่มกลมหรือแบน ปลายกลมหรือบวมมียอดเกสรเพศเมียเล็กอยู่ในช่องต้น โคนบวม กลีบเลี้ยงไม่ชัด ขนาด 4 มม. กลีบเลี้ยง สุกสีแดงสด ทั้งสีดำ ย่นมาก พบในป่าดิบบนเขาหินปูน สูง 80-150 ม.



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอนด์, สิบสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปพ. 2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

