

ไม้ต้น สูงถึง 24 ม. เรือนยอดแผ่กระจาย ลำต้นเป็นร่องบิต บางที่มีพูพอนลึกหรือรากค้ำยัน เปลือก สีน้ำตาลอ่อนหรือสีอมเทา เรียบหรือแตกเป็นร่องเล็กๆ เปลือกในสีชมพูอมส้มหรือน้ำตาลแดง ใบ กว้าง 2.5-5 ซม. ยาว 6-11 ซม. ออกห่างบนกิ่งหรือเป็นกลุ่มหลวมใกล้ปลายกิ่ง รูปไข่ถึงรูปรีหรือขอบขนาน ปลายเรียวแหลม สั้นหรือแหลม โคนห่อ ขอบจักซี่ฟันละเอียดหรือเกือบเรียบ ใบอ่อนสีแดงอมส้มออกน้ำตาลมีขนเส้นไหม ใบแก่ ด้านบนสีเขียวเข้มเกลี้ยง เมื่ออ่อนมีขน ต่อไปเกลี้ยง บางที่เป็นตุ่มหรือมีจุดดำ ใบแก่สีแดงอมส้ม หายากที่เป็นสีเหลือง เส้นใบโค้ง 4-6 คู่ จมด้านบน นูนด้านล่าง เส้นใบย่อยเป็นชั้นบันไดหรือร่างแห ค่อนข้างจาง ก้านใบยาว 1-3.5 ซม. เมื่ออ่อนมีขนเส้นไหม ต่อไปเกลี้ยง ปลายบวมพอง ดอก เล็กกว้าง 0.7 ซม. สีขาว สมบูรณ์เพศ ออกเป็นช่อเล็กเรียว แน่นตามซอกใบหรือใต้ระดับใบ ยาว 3-10 ซม. ก้านดอกยาว 3-7 ซม. มีขนกลีบเลี้ยง 5 กลีบ กว้าง 1 มม. ยาว 3 มม. รูปใบหอกหรือรูปสามเหลี่ยมแคบ มีขนทั้งสองด้านกลีบดอก 5 กลีบ กว้าง 2 มม. ยาว 3 มม. รูปลิ้น ขอบจักลึกเป็นฝอย ประมาณ $\frac{1}{2}$ ของความยาวกลีบ เกลี้ยง ด้านในไม่มีสันที่โคน ปลายมีต่อม เกสรผู้เพศ 10-16 อัน ยาว 1 มม. อับเรณูไม่ยาวเรียว รังไข่มีขนกระจาย มี 5 ช่องก้านเกสรตัวเมีย มีขนในครึ่งล่าง จากฐานดอกจักเป็นพูชัด 5 พู ผล 2.5-3 ซม. ออกเป็นช่อ ช่อละ 1-2 ผล รูปกลม ปลายใบกลมทั้งสองด้านสีเขียวขุ่น แก่สีออกเหลืองปนแดง เกลี้ยงหรือมีรอยย่น ก้านผลยาวไม่เกิน 0.5 ซม. ผนังหุ้มเมล็ดแข็ง มี 5 ช่อง มี 1-3 เมล็ด

-พบในป่าดิบสูงถึง 800 ม. ในที่โล่งหรือตามสันเขา จ. ระนอง พังงา สตูล ปัตตานี



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมบรอน ฟินคา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยาฤดี ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2558.

ภาพประกอบ : <http://npic-surat.com/web/index.php/2013-07-23-06-43-31/def/elaecarpaceae/118-elaecarpaceae?showall=&limitstart=>