

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้พุ่ม ใหญ่หรือไม้ต้นเล็ก สูงถึง 11 ม. กิ่งพาดเลื้อย เปลือก สีน้ำตาลอมแดงแตกเป็นแผ่นเล็ก ใบ รูปรีแคบถึงใบหอก กว้าง 2-3.5 ซม. ยาว 5-9 ซม. ออกห่างๆ ปลายเรียวแหลม โคนรูปลิ้น เนื้อคล้ายหนังบาง ด้านบนสีเขียวสดหรือเขียวเข้มขุ่น ด้านล่างสีเขียวอ่อนกว่าถึงสีอมเหลือง เส้นใบ 10-14 คู่เห็นชัด มีเส้นใบสั้นแซม ฐานชดด้านล่าง เชื่อมเป็นวงใกล้ขอบ เส้นใบบนด้านล่าง ก้านใบยาวประมาณ 0.5 ซม. ใหญ่แข็ง มีใบลดรูปคล้ายใบประดับ 2-4 ใบ รูปใบหอกหรือใบเข็ม อยู่ระหว่างโคนก้านใบ กิ่งสีน้ำตาลเข้ม เมื่ออ่อนมีสะเก็ดเล็กน้อย ดอกสีขาว ขนาด 3-4 ซม. ออกเดี่ยวที่ปลายกิ่งหรือ 1-3 ที่ง่ามใบ ก้านดอกยาวประมาณ 0.3 ซม. ใหญ่แข็ง มีใบประดับย่อยเล็กรูปใบหอกหลายใบที่โคน กลีบเลี้ยงสีเขียวอ่อน รูปไข่กว้างถึงค่อนข้าง กลม ยาว 8-10 ซม. ไม่เท่ากัน กลีบดอก 4 กลีบ รูปไข่กว้าง ปลายหู่ มักโค้งเข้าใน กว้าง 5-8 มม. ยาว 10-15 ซม. บางที่แยกไปเกือบถึงโคน (ทำให้เห็นเป็น 6 กลีบแคบ) เกสรเพศผู้ ยาว 8-15 มม. เล็กเรียว ปลายเกสรเพศเมีย มี 4 ง่าม ผล รูปลูกแพร์มีจอยสันหรือรูปไข่ถึงกลม กว้าง 1.5-2.5 ซม. ยาว 2.5-3.5 ซม. ปลายมีก้านเกสรเพศเมียเล็กติดอยู่ ก้านผลแข็ง ยาวประมาณ 1 ซม. มีกลีบเลี้ยงหนาสีเขียว อดมน้ำตาลอ่อนถึงสีน้ำตาลอมเหลืองติดอยู่ที่โคน พบที่ทั่วไปตามป่าดิบที่ต่ำ สูง 200 ม. ตามสันเขาหรือที่เปิด



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอนด์ พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

