

ไม้ต้น สูงได้ถึง 30 เมตร เปลือก สีน้ำตาล แตก เป็นรอยละเอียด เปลือกในสีแดงเข้ม ใบกว้าง 2.5-7 เซนติเมตร ยาว 8-25 เซนติเมตร รูปรีหรือขอบขนาน ปลายเรียวแหลม โคนกลมถึงรูปหัวใจแคบ ขอบเรียบ ใบอ่อนมีขนอ่อน ใบแก่ค่อนข้างหนาคล้ายหนัง เกือบด้านบน มีขนอ่อนประปรายบนเส้นใบเฉพาะด้านล่าง ไม่มีต่อมที่โคนใบ แต่ด้านล่างมีต่อมรูปจานอยู่ในร่องเส้นใบ เส้นใบ 9-15 คู่ แบนหรือนูนเล็กน้อยทั้งสองด้าน ไม่ยับย่น เส้นใบย่อยไม่ชัด ก้านใบยาว (0.5)1-1.7 เซนติเมตร ปลายและ โคนบวม หูใบยาว 1-2.5 เซนติเมตร คล้ายใบโค้ง ค่อนข้างติดทน ดอกเพศผู้ช่อดอกยาว 0.8-1.6 เซนติเมตร มีกลุ่มดอกแน่น 9-13 ดอก ออกเป็นระยะเท่าๆกันบนแกนกลางช่อ มี 2-5 ช่ออยู่ด้วยกันที่ง่ามใบ ก้านช่อดอกยาว 1-2 มิลลิเมตร ก้านดอกสั้นหรือไม่มี กลีบเลี้ยง 4-5 กลีบ ยาวประมาณ 0.5 มิลลิเมตร เชื่อมกันครึ่งกลีบ เกสรเพศผู้ มี 2(3) อัน ดอกเพศเมียเป็นช่อออกที่ง่ามใบ 2-3 ช่อ ช่อยาว 0.7-1.5 เซนติเมตร มีถึง 11 ดอก อยู่เป็นกลุ่มแน่นที่ส่วนบน 3/4 ของแกนกลาง ดอกยาว 2-2.5 มิลลิเมตร ก้านดอกยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยง 4-5 กลีบ ยาวประมาณ 0.7 มิลลิเมตร รังไข่มี 3 ช่อ ค่อนข้างเกลี้ยง ยอดเกสรเพศเมียยาว 2-2.5 มิลลิเมตร ผล ขนาด 0.9-1.5 เซนติเมตร ปลายไม่มีจะงอยหรือโคนแคบมีขนกระจายแล้วเกลี้ยง ไม่มีเนื้อ แก่แตกออก 3 ส่วน

หายากในป่าดิบ จ.ระนอง พังงา



ข้อมูลอ้างอิง : การ์คเนอร์, ไชมอน. ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

