

ไม้ต้นสูงถึง 40 เมตร ไม่ผลัดใบหรือผลัดในช่วงสั้น เรือนยอดแบนแผ่กว้าง กิ่งหลักชูขึ้น แตกกิ่งเจริญทางข้าง มีพุ่มหรือรากล้ำใสน้ำและรากหายใจในป่าพรุ เปลือก สีเทาอ่อนถึงสีอมเหลืองหรือน้ำตาลอมส้ม เรียบหรือเป็นร่องเล็กหรือเป็นเกล็ดบางๆ เปลือกในสีแดง มีน้ำเลี้ยงเป็นยางใส ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับหรือออกดกที่ปลายกิ่ง รูปไข่กลับแคบถึงรูปใบหอกกลับ กว้าง 5-18 เซนติเมตร ยาว 15-60(120) เซนติเมตร ค่อนข้างแคบไปยังโคนจนเป็นก้านใบ มีปีก มีพุ่มคล้ายดิงทุ 1 คู่ โอบก้านใบ ปลายพู่ถึงกลีบหรือมีแฉ่ง ขอบเรียบ ใบโตเต็มที่หนาคล้ายแผ่นหนัง เกลี้ยงและเป็นมันด้านบน ด้านล่างมีสีเขียวอมเหลือง มีเกล็ดคล้ายละอองเล็กๆ ใบแก่สีน้ำตาลอมเหลือง เส้นใบ 12-32 คู่ จมด้านบน เส้นใบย่อยคล้ายเป็นชั้นบันได งามหรือ ค่อนข้างชัดทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 3-7 เซนติเมตร ไม่มีปีก(หรือถ้ามีก็เพียงแคบๆ) มักมีร่องด้านบนชัด มีขนละเอียด บวมที่โคน แต่ไม่มีดิงทุ กิ่งใหญ่แข็งแรง มีรอยแผลเป็นที่ใบร่วงชัด เมื่ออ่อนมีขนกำมะหยี่ ดอกเล็ก สีเหลืองหรืออมเขียว ดอกแยกเพศ มีดอกเพศผู้และเพศเมียอยู่คนละต้น พบน้อยที่สมบูรณ์เพศ ออกเป็นช่อแตกแขนง ยาวถึง 35 เซนติเมตร ที่ช่อใบ ก้านดอกสั้นมาก กลีบเลี้ยงปลายมีพู่รูปไข่ 4 พู่ ยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร บานออก โคนซ้อนทับกัน เกสรเพศผู้ 8 อันยาว 1-1.5 มิลลิเมตร(เป็นหมันและสั้นกว่าในดอกเพศเมีย) อันที่ติดตรงกับกลีบดอกสั้นกว่าทุกอัน ฐานดอกกลม แบนในดอกเพศผู้ เป็นรูปถ้วยสั้นในดอกเพศเมีย รังไข่เหนือวงกลีบ กลม ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร มี 1 ช่อง ค่อนข้างเป็นชูย ก้านเกสรเพศเมียสั้น ยอดเกสรเพศเมียคล้ายจาน ผล รูปขอบขนานหรือรูปไข่ ขนาด 0.8 เซนติเมตร สีม่วงอมแดง สุกสีออกดำ แยกออกเป็น 2 เพียงบางส่วน ภายในกลวง มีผนังกันแข็ง มีเนื้อ ผนังผลชั้นในแข็ง มีเมล็ดโค้ง 1 เมล็ด

พบทั่วไปในป่าพรุหรือตามชายป่าดิบ สูงถึง 650 เมตร



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ พินคา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยาฤกษ์ ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม – พิมพ์ครั้งที่ 1-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปฟ. 2558. 768 หน้า: ภาพประกอบ

ภาพประกอบ : <https://www.flickr.com/photos/reulim/36491349560/in/photostream/>