

ไม้ต้น ไม้ผลัดใบ สูงได้ถึง 27 เมตร เปลือก สีน้ำตาลแดง เรียบหรือแตกเป็นร่องเล็กน้อย ลอกออก คล้ายแผ่นกระดาษบาง ใบ กว้าง 2.5-6 เซนติเมตร ยาว 7-18 เซนติเมตร ออกแผ่ระนาบเดียวบนกิ่ง รูปขอบขนานแกมรี ปลายทั้งสองด้านทู่ถึงแหลม ขอบเรียบ (ต้นเล็กขอบใบจักเป็นซี่ฟันแหลม) ใบแก่คล้าย กระดาษหนัง เป็นมันด้านบน เกือบทั้งสองด้าน มีเส้นใบโค้งหลายคู่ คู่ล่างๆ ค่อนข้างขนานกับขอบใบยาว เกือบไปถึงขอบใบและเชื่อมกับคู่ถัดขึ้นไป ก้านใบยาว 0.5-1.2 เซนติเมตร ดอก ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร สีขาว สมบูรณ์เพศ เป็นช่อสั้น มีหลายดอก ออกเป็นช่อกระจุกใหญ่ แต่ละช่อมีดอก 2-4 แถว ก้านดอกเล็ก ยาว 1-1.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ขนาดประมาณ 5 มิลลิเมตร ขยายขึ้นในผล กลีบดอก 5 กลีบ ขนาดประมาณ 5 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้มี 10 อัน ยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร ก้านชูอับเรณูชัด สั้นกว่าอับเรณู เกสรเพศเมียมี 5 อัน แยกกัน อยู่บนฐานดอกนูนบวม ก้านเกสรเพศเมียมี 1 อัน ยอดเกสรเพศเมียเล็ก ผล กว้าง 0.6 เซนติเมตร ยาวประมาณ 0.8 เซนติเมตร สุกสีดำ กลมแบน เนื้อบาง มีเกราะหุ้มเมล็ดแข็ง 1 อัน ภายในมีเมล็ดแข็ง 1 เมล็ด ผลมี 1-2(5) ผลอยู่บนฐานผลบวมนุ่มสีแดง ล้อมรอบด้วยกลีบเลี้ยงมีเนื้อสีแดง พบในป่าดิบ สูงได้ถึง 750 เมตร พบบนดินทราย จ.สุราษฎร์ธานี



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชมอน. ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี