

Polyalthia rumphii (Blume ex Hensch.) Merr.

นวลเขา (สังหยุครีม)

วงศ์ ANNONACEAE



ไม้ต้น

ขนาดกลาง สูง 8-20 ซม. กิ่งก้านเล็ก ห้อยลง เปลือกสีเทาถึงสีน้ำตาลอมเทาเข้ม หรือสีดำหม่น เรียบถึงละเอียด ใบรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก กว้าง 4-7 ซม. ยาว 10-20 ซม. ปลายแหลม โคนทู่หรือกลม มักเบี้ยวเล็กน้อยขอบเป็นคลื่น ใบอ่อนมีขนเล็กน้อยบนเส้นใบ ใบแก่เนื้อคล้ายหนังบาง เขียวเข้มเป็นมัน ด้านบน สีเขียวด้านล่าง ใบแห้งสีเขียวชุน กลี้ยง เส้นกลางใบสีน้ำตาลเข้ม เป็นมันด้านบน เส้นใบชัดโดยเฉพาะด้านบน เส้นใบเล็ก 8-12 คู่ ระยะห่างไม่เท่ากัน ไม่ขนานกัน ทำมุมแหลมชันกับเส้นกลางใบ เป็นวงและเชื่อมกันห่างจากขอบใบ 4-8 ซม. เห็นชัดด้านบน ด้านล่าง สีอ่อนกว่าเส้นกลางใบเมื่อใบแห้ง เส้นใบย่อยคล้ายตาข่าย งามด้านบน ชัดด้านล่าง ก้านใบยาว 0.4-0.8 ซม. กลี้ยงกิ่งสีน้ำตาลอ่อน มีขนสั้นนุ่มสีสนิมเมื่ออ่อน ต่อไปกลี้ยง มักคดไปมา ดอกสีเขียวอ่อน เมื่อแก่สีเหลืองทองเปล่ง มีแต้มสีม่วงเข้มที่โคน กลิ่นหอม ออกเดี่ยวหรือ 2-3 ดอก ตามซอกใบหรือใต้ตาใบเล็กน้อย ก้านดอกใหญ่ มีขนสีสนิม ใบประดับใหญ่ รูปใบหอก ยาว 5 มม. กลีบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยม ยาว 6-10 มม. ปลายแหลม ผลค่อนข้างกลม มีขนติดทนกว่า บางที่ใช้ชื่อ *P. jenkinsii* ในตัวอย่างในหอพรรณไม้ชื่อมักจะสับสนรวมทั้งในเอกสารด้วยพบในป่าดิบหรือป่าผลัดใบ สูง 500 ม. ขึ้นในที่โล่ง บางที่ขึ้นบนเขาหินปูน

ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชมอน พินตา สิทธิสุนทร ก่องกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม – พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : <https://www.flickr.com/photos/adaduitokla/15480955487/in/photostream/>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

