

ชื่อพื้นเมือง : กระถินแดง, กระถินป่า, สารเงิน



ไม้ต้น

ผลัดใบ สูงได้ถึง 25 ม. มีขนสีน้ำตาลแดง ตามกิ่งอ่อน ช่อดอก และกลีบเลี้ยงด้านนอก หูใบยาว 1-2 มม. ใบประกอบยาว 25-30 ซม. ใบประกอบย่อย มี 4-13 คู่ ใบย่อยมี 10-22 คู่ รูปขอบขนานแกมรูปไข่ ยาว 1.2-1.8 ซม. ปลายกลม เว้าตื้น โคนเบี้ยว แผ่นใบ มีขนสั้นนุ่มด้านล่าง ไร้ก้าน ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกที่ปลายกิ่ง ยาว 20-40 ซม. ใบประดับยาว 5-8 มม. ร่วงเร็ว ก้านดอกยาว 5-7 มม. ตาดอกกลม กลีบเลี้ยงรูปรี ยาว 5-8 มม. กลีบดอกรูปไข่กลับ โคนและ ก้านกลีบมีขน ก้านชูอับเรณูยาว 1.2-1.5 ซม. รังไข่มี ก้านสั้น ๆ มีขน ฝักรูปใบหอก ปลายแหลม โคนเรียว แคบ ยาวได้ถึง 12 ซม. ขอบมีปีกกว้าง 4-5 มม. มี 1-4 เมล็ด เรียงตามยาว พบที่กัมพูชา เวียดนามตอนใต้ และภูมิภาคมาเลเซีย ในไทยพบตามชายฝั่งทะเล และ ป่าโปร่งหลังป่าโกงกาง เป็นไม้ประดับ ในอินโดนีเซีย เปลือกใช้ย้อมผ้าบาติก

ข้อมูลอ้างอิง : [http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Peltophorum0pterocarpum0\(DC.\)0Backer0ex0K.0Heyne](http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Peltophorum0pterocarpum0(DC.)0Backer0ex0K.0Heyne)

ภาพประกอบ : [http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Peltophorum0pterocarpum0\(DC.\)0Backer0ex0K.0Heyne](http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Peltophorum0pterocarpum0(DC.)0Backer0ex0K.0Heyne)

