

ชื่อพื้นเมือง



ไม้ต้นขนาดเล็ก สูงถึง 14 ม. เปลือก สีน้ำตาลอมเทา เปลือกในมียางเหนียวอยู่บางๆ ใบ เล็ก กว้าง 2.2-4 ซม. ยาว 5-9 ซม. รูปไข่ถึงรี ปลายเรียวแหลม โคนทู่หรือรูปลิ้ม เนื้อคล้ายหนังบาง แห้งสีเขียวอมเทาถึงน้ำตาลอ่อน เส้นใบเล็กหลายคู่เป็นร่องขีดกัน ห่างกัน 2-3 มม. งามมาก ก้านใบเล็กประมาณ 0.8 ซม. กิ่งอ่อนมี 4 สัน ดอกเพศผู้ เล็ก ยาวน้อยกว่า 0.5 ซม. สีขาว ออกเป็นช่อกระจุกแน่นมี 20-30 ดอก ตามซอกใบและที่ปลายกิ่ง ก้านดอกเล็ก ยาวประมาณ 6 มม. กลีบเลี้ยง 4 กลีบ คู่นอกเล็ก คู่ในเกือบเท่ากลีบดอก กลีบดอก 4 กลีบ กลม เนื้อบาง มีขนละเอียดตามขอบ เกสรเพศผู้เป็นกลุ่มหนาแน่น 4 กลุ่มล้อมรอบยอดเกสรเพศเมีย มองคล้ายดอกเห็ด ก้านเกสรเพศเมียสั้นแข็ง ดอกเพศเมียใหญ่กว่าดอกเพศผู้เล็กน้อย ออกเป็นช่อกระจุกแน่น มี 3-10 ดอก กลีบเลี้ยงคล้ายในดอกเพศผู้หรือทุกกลีบเล็กคล้ายเป็นเกล็ด กลีบดอกคล้ายในดอกเพศผู้แต่เล็กกว่า ไม่มีเกสรเพศผู้ เป็นหมัน ยอดเกสรเพศเมียใหญ่ รูปครึ่งวงกลม มีปุ่ม ผล ยาว 1.5-2 ซม. ก้านผลเล็กเรียว ยาวถึง 0.5 ซม. กลมเกลี้ยง เนื้อบาง แข็ง มียอดเกสรเพศเมีย เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 มม. นูนหรือรูปจาน มีตุ่มพบน้อยในป่าดิบที่ต่ำและป่าดิบเขาไม่สูงนัก

ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โชนอน พินดา สิทธิสุนทร ก่องกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปฟ. 2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์กรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์กรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

